

A note on Artin-Markov normal form theorem for braid groups*

Yuqun Chen and Qiuhui Mo

School of Mathematical Sciences

South China Normal University

Guangzhou 510631

P. R. China

yqchen@scnu.edu.cn

scnuhuashimomo@126.com

Abstract: In a recent paper by L. A. Bokut, V. V. Chaynikov and K. P. Shum in 2007, Braid group B_n is represented by Artin-Burau's relations. For such a representation, it is told that all other compositions can be checked in the same way. In this note, we support this claim and check all compositions.

Key words: Braid group, Gröbner-Shirshov bases.

AMS Mathematics Subject Classification(2000): 20E06, 20F05, 16S15, 13P10

1 Introduction

In two classical papers by A. A. Markov [9] and E. Artin [1], the normal form theorem for braid groups was established. Recently, a new proof of this result had been published by L. A. Bokut, V. V. Chaynikov and K. P. Shum [5]. The last proof is based on Gröbner-Shirshov bases theory for non-commutative (and non-associative) algebras invented by A. I. Shirshov [10]. In what follows, we will use the presentation of this theory from L. A. Bokut and K. P. Shum [7], and L. A. Bokut and Y. Q. Chen [6]. To be more precise, some compositions (S -polynomials) of Artin-Burau's relations were checked in [5], and it was claimed that all other compositions can be checked in the same way. In this paper, we support the last claim and show that all compositions of Artin-Markov's relations are trivial.

2 Basic notation and results

We first cite some concepts and results from the literature [10, 3, 4] which are related to the Gröbner-Shirshov bases for associative algebras.

*Supported by the NNSF of China (No.10771077) and the NSF of Guangdong Province (No.06025062).

Let k be a field, $k\langle X \rangle$ the free associative algebra over k generated by X and X^* the free monoid generated by X , where the empty word is the identity which is denoted by 1. For a word $w \in X^*$, we denote the length of w by $|w|$. Let X^* be a well ordered set. Let $f \in k\langle X \rangle$ with the leading word $\bar{f}$. Then we call f monic if $\bar{f}$ has coefficient 1.

A well order $>$ on X^* is called monomial if it is compatible with the multiplication of words, that is, for $u, v \in X^*$, we have

$$u > v \Rightarrow w_1 u w_2 > w_1 v w_2, \text{ for all } w_1, w_2 \in X^*.$$

A standard example of monomial order on X^* is the deg-lex order to compare two words first by degree and then lexicographically, where X is a linearly ordered set.

Let f and g be two monic polynomials in $k\langle X \rangle$ and $<$ a monomial order on X^* . Then, there are two kinds of compositions:

(i) If w is a word such that $w = \bar{f}b = a\bar{g}$ for some $a, b \in X^*$ with $|\bar{f}| + |\bar{g}| > |w|$, then the polynomial $(f, g)_w = fb - ag$ is called the intersection composition of f and g with respect to w .

(ii) If $w = \bar{f} = a\bar{g}b$ for some $a, b \in X^*$, then the polynomial $(f, g)_w = f - agb$ is called the inclusion composition of f and g with respect to w .

Let $S \subset k\langle X \rangle$ such that every $s \in S$ is monic. Then the composition $(f, g)_w$ is called trivial modulo (S, w) if $(f, g)_w = \sum \alpha_i a_i s_i b_i$, where each $\alpha_i \in k$, $a_i, b_i \in X^*$, $s_i \in S$ and $a_i \bar{s}_i b_i < w$. If this is the case, then we write

$$(f, g)_w \equiv 0 \mod(S, w).$$

In general, for $p, q \in k\langle X \rangle$, we write $p \equiv q \mod(S, w)$ which means that $p - q = \sum \alpha_i a_i s_i b_i$, where each $\alpha_i \in k$, $a_i, b_i \in X^*$, $s_i \in S$ and $a_i \bar{s}_i b_i < w$.

A set $S \subset k\langle X \rangle$ is called a Gröbner-Shirshov basis with respect to the monomial order $<$ if any composition of polynomials in S is trivial modulo S .

The following lemma was first proved by Shirshov [10] for free Lie algebras (with deg-lex order) (see also Bokut [3]). Bokut [4] specialized the approach of Shirshov to associative algebras (see also Bergman [2]). For the case of commutative polynomials, this lemma is known as the Buchberger's Theorem [8].

Lemma 2.1 (*Composition-Diamond Lemma*) *Let k be a field, $A = k\langle X | S \rangle = k\langle X \rangle / Id(S)$ and $<$ a monomial order on X^* , where $Id(S)$ is the ideal of $k\langle X \rangle$ generated by S . Then S is a Gröbner-Shirshov basis if and only if $Irr(S) = \{u \in X^* | u \neq a\bar{s}b, s \in S, a, b \in X^*\}$ is a linear basis of the algebra $A = k\langle X | S \rangle$.*

Let $A = sgp\langle X | S \rangle$ be a semigroup presentation. By abuse of notation, S is also a subset of $k\langle X \rangle$. Suppose that S is a Gröbner-Shirshov basis of $k\langle X | S \rangle$. Then the S -irreducible set $Irr(S) = \{u \in X^* | u \neq a\bar{f}b, a, b \in X^*, f \in S\}$ is a linear basis of $k\langle X | S \rangle$ which is also a normal form of A .

Definition 2.2 ([5]) *Let $\Sigma = \{\sigma_1, \dots, \sigma_{n-1}\}$ be a finite alphabet. Then, the following group presentation defines the n -strand braid group:*

$$B_n = gp\langle \Sigma \mid \sigma_{t+1}\sigma_t\sigma_{t+1} = \sigma_t\sigma_{t+1}\sigma_t \ (1 \leq t \leq n-2), \ \sigma_i\sigma_j = \sigma_j\sigma_i \ (2 \leq 1+j < i \leq n-1) \rangle.$$

We now introduce the concept of *inverse tower order* of words.

Definition 2.3 ([5]) Let $X = Y \dot{\cup} Z$, words Y^* and the letters in Z be well ordered. Suppose that the order on Y^* is monomial. Then, any word in X has the form $u = u_0 z_1 u_1 \cdots z_k u_k$, where $k \geq 0$, $u_i \in Y^*$, $z_i \in Z$. Define the inverse weight of the word $u \in X^*$ by

$$\text{inwt}(u) = (k, u_k, z_k, \cdots, u_1, z_1, u_0).$$

Now we order the inverse weights lexicographically as follows

$$u > v \Leftrightarrow \text{inwt}(u) > \text{inwt}(v).$$

Then we call the above order the *inverse tower order*. Clearly, this order is a monomial order on X^* .

In case $Y = T \dot{\cup} U$ and Y^* is endowed with the inverse tower order, we call the order of words in X the *inverse tower order of words relative to the presentation*

$$X = (T \dot{\cup} U) \dot{\cup} Z.$$

In general, we can define the inverse tower order of X -words relative to the presentation

$$X = (\cdots (X^{(n)} \dot{\cup} X^{(n-1)}) \dot{\cup} \cdots) \dot{\cup} X^{(0)},$$

where $X^{(n)}$ -words are endowed by a monomial order.

In the braid group B_n , we now introduce a new set of generators which are called the Artin-Burau generators. We set

$$\begin{aligned} s_{i,i+1} &= \sigma_i^2, & s_{i,j+1} &= \sigma_j \cdots \sigma_{i+1} \sigma_i^2 \sigma_{i+1}^{-1} \cdots \sigma_j^{-1}, & 1 \leq i < j \leq n-1; \\ s_{i,j+1} &= \sigma_i^{-1} \cdots \sigma_j^{-1}, & 1 \leq i \leq j \leq n-1; & & \sigma_{ii} = 1, \quad \{a, b\} = b^{-1}ab. \end{aligned}$$

Form the set

$$S_j = \{s_{i,j}, s_{i,j}^{-1}, 1 \leq i, j < n\} \quad \text{and} \quad \Sigma^{-1} = \{\sigma_1^{-1}, \cdots, \sigma_{n-1}^{-1}\}.$$

Then the set

$$S = S_n \cup S_{n-1} \cup \cdots \cup S_2 \cup \Sigma^{-1}$$

generates B_n as a semigroup.

Now we order the set S in the following way:

$$S_n < S_{n-1} < \cdots < S_2 < \Sigma^{-1},$$

and

$$s_{1,j}^{-1} < s_{1,j} < s_{2,j}^{-1} < \cdots < s_{j-1,j}, \quad \sigma_1^{-1} < \sigma_2^{-1} < \cdots < \sigma_{n-1}^{-1}.$$

With the above notation, we now order the S -words by using the inverse tower order, according to the fixed presentation of S as the union of S_j and Σ^{-1} . We order the S_n -words by the *deg - inlex* order, i.e., we first compare the words by length and then by inverse lexicographical order, starting from their last letters.

Lemma 2.4 ([5]) *The following Artin-Markov relations hold in the braid group B_n . For $\delta = \pm 1$,*

$$\sigma_k^{-1} s_{i,j}^\delta = s_{i,j}^\delta \sigma_k^{-1}, k \neq i-1, i, j-1, j \quad (1)$$

$$\sigma_i^{-1} s_{i,i+1}^\delta = s_{i,i+1}^\delta \sigma_i^{-1} \quad (2)$$

$$\sigma_{i-1}^{-1} s_{i,j}^\delta = s_{i-1,j}^\delta \sigma_{i-1}^{-1} \quad (3)$$

$$\sigma_i^{-1} s_{i,j}^\delta = \{s_{i+1,j}^\delta, s_{i,i+1}^\delta\} \sigma_i^{-1} \quad (4)$$

$$\sigma_{j-1}^{-1} s_{i,j}^\delta = s_{i,j-1}^\delta \sigma_{j-1}^{-1} \quad (5)$$

$$\sigma_j^{-1} s_{i,j}^\delta = \{s_{i,j+1}^\delta, s_{j,j+1}^\delta\} \sigma_j^{-1} \quad (6)$$

for $i < j < k < l$, $\varepsilon = \pm 1$,

$$s_{j,k}^{-1} s_{k,l}^\varepsilon = \{s_{k,l}^\varepsilon, s_{j,l}^{-1}\} s_{j,k}^{-1} \quad (7)$$

$$s_{j,k} s_{k,l}^\varepsilon = \{s_{k,l}^\varepsilon, s_{j,l} s_{k,l}\} s_{j,k} \quad (8)$$

$$s_{j,k}^{-1} s_{j,l}^\varepsilon = \{s_{j,l}^\varepsilon, s_{k,l}^{-1} s_{j,l}^{-1}\} s_{j,k}^{-1} \quad (9)$$

$$s_{j,k} s_{j,l}^\varepsilon = \{s_{j,l}^\varepsilon, s_{k,l}\} s_{j,k} \quad (10)$$

$$s_{i,k}^{-1} s_{j,l}^\varepsilon = \{s_{j,l}^\varepsilon, s_{k,l} s_{i,l} s_{k,l}^{-1} s_{i,l}^{-1}\} s_{i,k}^{-1} \quad (11)$$

$$s_{i,k} s_{j,l}^\varepsilon = \{s_{j,l}^\varepsilon, s_{i,l}^{-1} s_{k,l}^{-1} s_{i,l} s_{k,l}\} s_{i,k} \quad (12)$$

for $j < i < k < l$ or $i < k < j < l$, and $\varepsilon, \delta = \pm 1$,

$$s_{i,k}^\delta s_{j,l}^\varepsilon = s_{j,l}^\varepsilon s_{i,k}^\delta \quad (13)$$

and

$$\sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} = \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1}, j < k-1 \quad (14)$$

$$\sigma_{j,j+1} \sigma_{k,j+1} = \sigma_{k,j+1} \sigma_{j-1,j}, j < k \quad (15)$$

$$\sigma_i^{-2} = s_{i,i+l}^{-1} \quad (16)$$

$$s_{i,j}^{\pm 1} s_{i,j}^{\mp 1} = 1 \quad (17)$$

The following theorem is from L. A. Bokut, V. V. Chaynikov and K. P. Shum [5] in which the authors checked some compositions in (1)-(17) and claimed that all compositions can be checked to be trivial in the same way. Here, we support the claim and check all compositions.

Theorem 2.5 ([5]) *The Artin-Markov relations (1)-(17) form a minimal Gröbner-Shirshov basis of the braid group B_n in terms of the Artin-Burau generators relative to the inverse tower order of words.*

Proof: We check all compositions step by step.

Denote by $(i) \wedge (j)$ the composition of the type (i) and type (j) , and $s_{i,j} = (i, j) = (ij)$.

$(1) \wedge (7)$

Let $f = \sigma_q^{-1} (jk)^{-1} - (jk)^{-1} \sigma_q^{-1}$, $q \neq j, j-1, k, k-1$, $g = (jk)^{-1} (kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\} (jk)^{-1}$, $j < k < l$. Then $w = \sigma_q^{-1} (jk)^{-1} (kl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_q^{-1} \{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\} (jk)^{-1} - (jk)^{-1} \sigma_q^{-1} (kl)^\varepsilon.$$

There are three cases to consider.

1) $q \neq l, l-1$. This case is trivial.

2) $q = l$.

$$\begin{aligned}
& \sigma_q^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1} \\
&= \sigma_l^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1} \\
&\equiv \{\{(k, l+1)^\varepsilon, (l, l+1)\}, \{(j, l+1)^{-1}, (l, l+1)\}\}\sigma_l^{-1}(jk)^{-1} \\
&\equiv \{(k, l+1)^\varepsilon, (j, l+1)^{-1}(l, l+1)\}(jk)^{-1}\sigma_l^{-1} \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (jk)^{-1}\sigma_q^{-1}(kl)^\varepsilon = (jk)^{-1}\sigma_l^{-1}(kl)^\varepsilon \\
&\equiv (jk)^{-1}\{(k, l+1)^\varepsilon, (l, l+1)\}\sigma_l^{-1} \\
&\equiv \{\{(k, l+1)^\varepsilon, (j, l+1)^{-1}\}, (l, l+1)\}(jk)^{-1}\sigma_l^{-1} \\
&\equiv \{(k, l+1)^\varepsilon, (j, l+1)^{-1}(l, l+1)\}(jk)^{-1}\sigma_l^{-1}.
\end{aligned}$$

Thus, $(f, g)_w \equiv 0$.

3) $q = l-1$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_{l-1}^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - (jk)^{-1}\sigma_{l-1}^{-1}(kl)^\varepsilon \\
&\equiv \{(k, l-l)^\varepsilon, (j, l-1)^{-1}\}(jk)^{-1}\sigma_{l-1}^{-1} - (jk)^{-1}(k, l-l)^\varepsilon\sigma_{l-1}^{-1} \\
&\equiv \{(k, l-l)^\varepsilon, (j, l-1)^{-1}\}(jk)^{-1}\sigma_{l-1}^{-1} - \{(k, l-l)^\varepsilon, (j, l-1)^{-1}\}(jk)^{-1}\sigma_{l-1}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(1) $\wedge$ (8)

Let n $f = \sigma_q^{-1}(jk) - (jk)\sigma_q^{-1}$, $q \neq j, j-1, k, k-1$, $g = (jk)(kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk)$, $j < k < l$. Then $w = \sigma_q^{-1}(jk)(kl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_q^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk) - (jk)\sigma_q^{-1}(kl)^\varepsilon.$$

There are three cases to consider.

1) The case $q \neq l, l-1$ is trivial.

2) $q = l$.

$$\begin{aligned}
& \sigma_l^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk) \\
&\equiv \{(k, l+1)^\varepsilon, (j, l+1)(k, l+1)(l, l+1)\}(jk)\sigma_l^{-1} \quad \text{and} \\
& (jk)\sigma_l^{-1}(kl)^\varepsilon \\
&\equiv (jk)\{(k, l+1)^\varepsilon, (l, l+1)\}\sigma_l^{-1} \\
&\equiv \{(k, l+1)^\varepsilon, (j, l+1)(k, l+1)(l, l+1)\}(jk)\sigma_l^{-1}.
\end{aligned}$$

3) $q = l - 1$.

$$\begin{aligned}
& \sigma_{l-1}^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jk)(kl)\}(jk) \\
& \equiv \{(k, l-l)^\varepsilon, (j, l-1)(k, l-1)\}(jk)\sigma_{l-1}^{-1} \quad \text{and} \\
& (jk)\sigma_{l-1}^{-1}(kl)^\varepsilon \\
& \equiv (jk)(k, l-1)^\varepsilon\sigma_{l-1}^{-1} \\
& \equiv \{(k, l-l)^\varepsilon, (j, l-1)(k, l-1)\}(jk)\sigma_{l-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

(1) $\wedge$ (9)

Let $f = \sigma_q^{-1}(jk)^{-1} - (jk)^{-1}\sigma_q^{-1}$, $q \neq j, j-1, k, k-1$, $g = (jk)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1}$, $j < k < l$. Then $w = \sigma_q^{-1}(jk)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w \equiv \sigma_q^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - (jk)^{-1}\sigma_q^{-1}(jl)^\varepsilon.$$

There are three cases to consider.

1) The case $q \neq l, l-1$ is trivial.

2) $q = l$.

$$\begin{aligned}
& \sigma_l^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1} \\
& \equiv \{(j, l+1)^\varepsilon, (k, l+1)^{-1}(j, l+1)^{-1}(l, l+1)\}(jk)^{-1}\sigma_l^{-1} \quad \text{and} \\
& (jk)^{-1}\sigma_l^{-1}(j, l)^\varepsilon \\
& \equiv (jk)^{-1}\{(j, l+1)^\varepsilon, (l, l+1)\}\sigma_l^{-1} \\
& \equiv \{(j, l+1)^\varepsilon, (k, l+1)^{-1}(j, l+1)^{-1}(l, l+1)\}(jk)^{-1}\sigma_l^{-1}.
\end{aligned}$$

3) $q = l - 1$.

$$\begin{aligned}
& \sigma_{l-1}^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1} \\
& \equiv \{(j, l-1)^\varepsilon, (k, l-1)^{-1}(j, l-1)^{-1}\}(jk)^{-1}\sigma_{l-1}^{-1} \quad \text{and} \\
& (jk)^{-1}\sigma_{l-1}^{-1}(jl)^\varepsilon \\
& \equiv (jk)^{-1}(j, l-1)^\varepsilon\sigma_{l-1}^{-1} \\
& \equiv \{(j, l-1)^\varepsilon, (k, l-1)^{-1}(j, l-1)^{-1}\}(jk)^{-1}\sigma_{l-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

(1) $\wedge$ (10)

Let $f = \sigma_q^{-1}(jk) - (jk)\sigma_q^{-1}$, $q \neq j, j-1, k, k-1$, $g = (jk)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (k, l)\}(jk)$, $j < k < l$. Then $w = \sigma_q^{-1}(jk)(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_q^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk) - (jk)\sigma_q^{-1}(jl)^\varepsilon.$$

There are three cases to consider.

1) The case $q \neq l, l-1$ is trivial.

2) $q = l$.

$$(f, g)_w \equiv \{(j, l+1)^\varepsilon, (k, l+1)(l, l+1)\}(jk)\sigma_q^{-1} - \{(j, l+1)^\varepsilon, (k, l+1)(l, l+1)\}(jk)\sigma_q^{-1} \equiv 0.$$

3) $q = l-1$.

$$(f, g)_w \equiv \{(j, l-1)^\varepsilon, (k, l-1)\}(jk)\sigma_{l-1}^{-1} - \{(j, l-1)^\varepsilon, (k, l-1)\}(jk)\sigma_{l-1}^{-1} \equiv 0.$$

(1) $\wedge$ (11)

Let $f = \sigma_q^{-1}(ik)^{-1} - (ik)^{-1}\sigma_q^{-1}$, $q \neq i, i-1, k, k-1$, $g = (ik)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}$, $i < j < k < l$. Then $w = \sigma_q^{-1}(ik)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_q^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} - (ik)^{-1}\sigma_q^{-1}(jl)^\varepsilon.$$

There are five cases to consider.

1) The case $q \neq l, l-1, j, j-1$ is trivial.

2) $q = j$.

$$\begin{aligned} & \sigma_j^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} \\ \equiv & \{(j+1, l)^\varepsilon, (j, j+1)(kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}\sigma_j^{-1} \\ \equiv & \{(j+1, l)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}(j, j+1)\}(ik)^{-1}\sigma_j^{-1} \quad \text{and} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (ik)^{-1}\sigma_j^{-1}(jl)^\varepsilon \\ \equiv & (ik)^{-1}\{(j+1, l)^\varepsilon, (j, j+1)\}\sigma_j^{-1} \\ \equiv & \{(j+1, l)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}(j, j+1)\}(ik)^{-1}\sigma_j^{-1}. \end{aligned}$$

3) $q = j-1$.

$$\begin{aligned} (f, g)_w & \equiv \{(j-1, l)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}\sigma_{j-1}^{-1} \\ & \quad - \{(j-1, l)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}\sigma_{j-1}^{-1} \\ & \equiv 0. \end{aligned}$$

4) $q = l$.

$$\begin{aligned} (f, g)_w & \equiv \{(j, l+1)^\varepsilon, (k, l+1)(i, l+1)(k, l+1)^{-1}(i, l+1)^{-1}(l, l+1)\}(ik)^{-1}\sigma_l^{-1} \\ & \quad - \{(j, l+1)^\varepsilon, (k, l+1)(i, l+1)(k, l+1)^{-1}(i, l+1)^{-1}(l, l+1)\}(ik)^{-1}\sigma_l^{-1} \\ & \equiv 0. \end{aligned}$$

5) $q = l-1$.

$$\begin{aligned} (f, g)_w & \equiv \{(j, l-1)^\varepsilon, (k, l-1)(i, l-1)(k, l-1)^{-1}(i, l-1)^{-1}\}(ik)^{-1}\sigma_{l-1}^{-1} \\ & \quad - \{(j, l-1)^\varepsilon, (k, l-1)(i, l-1)(k, l-1)^{-1}(i, l-1)^{-1}\}(ik)^{-1}\sigma_{l-1}^{-1} \\ & \equiv 0. \end{aligned}$$

(1) $\wedge$ (12)

Let $f = \sigma_q^{-1}(ik) - (ik)\sigma_q^{-1}$, $q \neq i, i-1, k, k-1$, $g = (ik)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik)$, $i < j < k < l$. Then $w = \sigma_q^{-1}(ik)(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_q^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) - (ik)\sigma_q^{-1}\{(jl)^\varepsilon.$$

There are five cases to consider.

1) The case $q \neq l, l-1, j, j-1$ is trivial.

2) $q = j$.

$$\begin{aligned} & \sigma_j^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) \\ \equiv & \{(j+1, l)^\varepsilon, (j, j+1)(il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik)\sigma_j^{-1} \\ \equiv & \{(j+1, l)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)(j, j+1)\}(ik)\sigma_j^{-1} \quad \text{and} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (ik)\sigma_j^{-1}(jl)^\varepsilon \\ = & (ik)\{(j+1, l)^\varepsilon, (j, j+1)\}\sigma_j^{-1} \\ \equiv & \{(j+1, l)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)(j, j+1)\}(ik)\sigma_j^{-1}. \end{aligned}$$

3) $q = j-1$.

$$\begin{aligned} (f, g)_w & \equiv \{(j-1, l)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik)\sigma_{j-1}^{-1} - \\ & \quad \{(j-1, l)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik)\sigma_{j-1}^{-1} \\ & \equiv 0. \end{aligned}$$

4) $q = l$.

$$\begin{aligned} (f, g)_w & \equiv \{(j, l+1)^\varepsilon, (i, l+1)^{-1}(k, l+1)^{-1}(i, l+1)(k, l+1)(l, l+1)\}(ik)\sigma_l^{-1} \\ & \quad - \{(j, l+1)^\varepsilon, (i, l+1)^{-1}(k, l+1)^{-1}(i, l+1)(k, l+1)(l, l+1)\}(ik)\sigma_l^{-1} \\ & \equiv 0. \end{aligned}$$

5) $q = l-1$.

$$\begin{aligned} (f, g)_w & \equiv \{(j, l-1)^\varepsilon, (i, l-1)^{-1}(k, l-1)^{-1}(i, l-1)(k, l-1)\}(ik)\sigma_{l-1}^{-1} \\ & \quad - \{(j, l-1)^\varepsilon, (i, l-1)^{-1}(k, l-1)^{-1}(i, l-1)(k, l-1)\}(ik)\sigma_{l-1}^{-1} \\ & \equiv 0. \end{aligned}$$

(1) $\wedge$ (13)

Let $f = \sigma_q^{-1}(ik)\delta - (ik)^\delta\sigma_q^{-1}$, $q \neq i, i-1, k, k-1$, $g = (ik)^\delta(jl)^\varepsilon - (jl)^\varepsilon(ik)^\delta$, $j < i < k < l$ or $i < k < j < l$. Then $w = \sigma_q^{-1}(ik)^\delta(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_q^{-1}(jl)^\varepsilon(ik)^\delta - (ik)^\delta\sigma_q^{-1}(jl)^\varepsilon.$$

There are five cases to consider.

1) The case $q \neq l, l-1, j, j-1$ is trivial.

2) $q = j$.

$$\begin{aligned} & \sigma_j^{-1}(jl)^\varepsilon(ik)^\delta \\ \equiv & \{(j+1, l)^\varepsilon, (j, j+1)\}\sigma_j^{-1}(ik)^\delta \\ \equiv & \{(j+1, l)^\varepsilon, (j, j+1)\}(ik)^\delta\sigma_j^{-1} \quad \text{and} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (ik)^\delta\sigma_j^{-1}(jl)^\varepsilon \\ \equiv & (ik)^\delta\{(j+1, l)^\varepsilon, (j, j+1)\}\sigma_j^{-1} \\ \equiv & \{(j+1, l)^\varepsilon, (j, j+1)\}(ik)^\delta\sigma_j^{-1}. \end{aligned}$$

3) $q = j-1$.

$$(f, g)_w \equiv (j-1, l)^\varepsilon(ik)^\delta\sigma_{j-1}^{-1} - (j-1, l)^\varepsilon(ik)^\delta\sigma_{j-1}^{-1} \equiv 0.$$

4) $q = l$.

$$(f, g)_w \equiv \{(j, l+1)^\varepsilon, (l, l+1)\}(ik)^\delta\sigma_l^{-1} - \{(j, l+1)^\varepsilon, (l, l+1)\}(ik)^\delta\sigma_l^{-1} \equiv 0.$$

5) $q = l-1$.

$$(f, g)_w \equiv (j, l-1)^\varepsilon(ik)^\delta\sigma_{l-1}^{-1} - (j, l-1)^\varepsilon(ik)^\delta\sigma_{l-1}^{-1} \equiv 0.$$

(2) $\wedge$ (7)

Let $f = \sigma_j^{-1}(j, j+1)^{-1} - (j, j+1)^{-1}\sigma_j^{-1}$, $g = (j, j+1)^{-1}(j+1, l)^\varepsilon - \{(j+1, l)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(j, j+1)^{-1}$, $j+1 < l$. Then $w = \sigma_j^{-1}(j, j+1)^{-1}(j+1, l)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned} (f, g)_w &= \sigma_j^{-1}\{(j+1, l)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(j, j+1)^{-1} - (j, j+1)^{-1}\sigma_j^{-1}(j+1, l)^\varepsilon \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, \{(j+1, l)^{-1}, (j, j+1)\}\}(j, j+1)^{-1}\sigma_j^{-1} - \\ &\quad (j, j+1)^{-1}(jl)^\varepsilon\sigma_j^{-1} \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (j+1, l)^{-1}(jl)^{-1}\}(j, j+1)^{-1}\sigma_j^{-1} - \{(jl)^\varepsilon, (j+1, l)^{-1}(jl)^{-1}\}(j, j+1)^{-1}\sigma_j^{-1} \\ &\equiv 0. \end{aligned}$$

(2) $\wedge$ (8)

Let $f = \sigma_j^{-1}(j, j+1) - (j, j+1)\sigma_j^{-1}$, $g = (j, j+1)(j+1, l)^\varepsilon - \{(j+1, l)^\varepsilon, (jl)(j+1, l)\}(j, j+1)$, $j+1 < l$. Then $w = \sigma_j^{-1}(j, j+1)(j+1, l)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned} (f, g)_w &= \sigma_j^{-1}\{(j+1, l)^\varepsilon, (jl)(j+1, l)\}(j, j+1) - (j, j+1)\sigma_j^{-1}(j+1, l)^\varepsilon \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, \{(j+1, l), (j, j+1)\}(jl)\}(j, j+1)\sigma_j^{-1} - (j, j+1)(jl)^\varepsilon\sigma_j^{-1} \\ &\equiv (jl)^{-1}(j, j+1)^{-1}(j+1, l)^{-1}(j, j+1)(jl)^\varepsilon(j, j+1)^{-1}(j+1, l)(j, j+1) \\ &\quad (jl)(j, j+1)\sigma_j^{-1} - \{(jl)^\varepsilon, (j+1, l)\}(j, j+1)\sigma_j^{-1} \\ &\equiv (jl)^{-1}(jl)(j+1, l)^{-1}(jl)^{-1}(j, j+1)^{-1}(j, j+1)(jl)^\varepsilon(jl)(j+1, l)(jl)^{-1}(j, j+1)^{-1} \\ &\quad (j, j+1)(jl)(j, j+1)\sigma_j^{-1} - \{(jl)^\varepsilon, (j+1, l)\}(j, j+1)\sigma_j^{-1} \\ &\equiv 0. \end{aligned}$$

(2) $\wedge$ (9)

Let $f = \sigma_j^{-1}(j, j+1)^{-1} - (j, j+1)^{-1}\sigma_j^{-1}$, $g = (j, j+1)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (j+1, l)^{-1}(jl)^{-1}\}(j, j+1)^{-1}$, $j+1 < l$. Then $w = \sigma_j^{-1}(j, j+1)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_j^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (j+1, l)^{-1}(jl)^{-1}\}(j, j+1)^{-1} - (j, j+1)^{-1}\sigma_j^{-1}(jl)^\varepsilon \\
&\equiv \{\{(j+1, l)^\varepsilon, (j, j+1)\}, (jl)^{-1}\{(j+1, l)^{-1}, (j, j+1)\}\}(j, j+1)^{-1}\sigma_j^{-1} \\
&\quad - (j, j+1)^{-1}\{(j+1, l)^\varepsilon, (j, j+1)\}\sigma_j^{-1} \\
&\equiv (j, j+1)^{-1}(j+1, l)(j, j+1)(jl)(j, j+1)^{-1}(j+1, l)^\varepsilon(j, j+1)(jl)^{-1}(j, j+1)^{-1}\sigma_j^{-1} \\
&\quad - \{(j+1, l)^\varepsilon, (jl)^{-1}(j, j+1)\}(j, j+1)^{-1}\sigma_j^{-1} \\
&\equiv (jl)(j+1, l)(jl)^{-1}(j, j+1)^{-1}(j, j+1)(jl)(j, j+1)^{-1}(j+1, l)^\varepsilon(j, j+1)(jl)^{-1}(jl) \\
&\quad (j+1, l)^{-1}(jl)^{-1}(j, j+1)^{-1}\sigma_j^{-1} - (j, j+1)^{-1}\{(j+1, l)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}\sigma_j^{-1} \\
&\equiv (jl)(j+1, l)(jl)(j+1, l)^\varepsilon(jl)^{-1}(j, j+1)^{-1}(j, j+1)(j+1, l)^{-1}(jl)^{-1}(j, j+1)^{-1}\sigma_j^{-1} \\
&\quad - \{\{(j+1, l)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}, \{(jl)^{-1}, (j+1, l)^{-1}(jl)^{-1}\}\}(j, j+1)^{-1}\sigma_j^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(2) $\wedge$ (10)

Let $f = \sigma_j^{-1}(j, j+1) - (j, j+1)\sigma_j^{-1}$, $g = (j, j+1)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (j+1, l)\}(j, j+1)$, $j+1 < l$. Then $w = \sigma_j^{-1}(j, j+1)(jl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_j^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (j+1, l)\}(j, j+1) - (j, j+1)\sigma_j^{-1}(jl)^\varepsilon \\
&\equiv \sigma_j^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (j+1, l)\}(j, j+1) - (j, j+1)\{(j+1, l)^\varepsilon, (j, j+1)\}\sigma_j^{-1} \\
&\equiv \{\{(j+1, l)^\varepsilon, (j, j+1)\}, (jl)\}(j, j+1)\sigma_j^{-1} - (j+1, l)^\varepsilon(j, j+1)\sigma_j^{-1} \\
&\equiv (jl)^{-1}(j, j+1)^{-1}(j+1, l)^\varepsilon(j, j+1)(jl)(j, j+1)\sigma_j^{-1} - (j+1, l)^\varepsilon(j, j+1)\sigma_j^{-1} \\
&\equiv (jl)^{-1}(jl)(j+1, l)^\varepsilon(jl)^{-1}(j, j+1)^{-1}(j, j+1)(jl)(j, j+1)\sigma_j^{-1} - \\
&\quad (j+1, l)^\varepsilon(j, j+1)\sigma_j^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(2) $\wedge$ (13)

Let $f = \sigma_i^{-1}(i, i+1)^\delta - (i, i+1)^\delta\sigma_i^{-1}$, $g = (i, i+1)^\delta(jl)^\varepsilon - (jl)^\varepsilon(i, i+1)^\delta$, $j < i < i+1 < l$ or $i < i+1 < j < l$. Then $w = \sigma_i^{-1}(i, i+1)^\delta(jl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_i^{-1}(jl)^\varepsilon(i, i+1)^\delta - (i, i+1)^\delta\sigma_i^{-1}(jl)^\varepsilon \\
&\equiv (jl)^\varepsilon\sigma_i^{-1}(i, i+1)^\delta - (i, i+1)^\delta(jl)^\varepsilon\sigma_i^{-1} \\
&\equiv (jl)^\varepsilon(i, i+1)^\delta\sigma_i^{-1} - (jl)^\varepsilon(i, i+1)^\delta\sigma_i^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(3) $\wedge$ (7)

Let $f = \sigma_{j-1}^{-1}(jk)^{-1} - (j-1, k)^{-1}\sigma_{j-1}^{-1}$, $g = (jk)^{-1}(kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1}$, $j < k < l$. Then $w = \sigma_{j-1}^{-1}(jk)^{-1}(kl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_{j-1}^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - (j-1, k)^{-1}\sigma_{j-1}^{-1}(kl)^\varepsilon \\
&\equiv \{(kl)^\varepsilon, (j-1, l)^{-1}\}(j-1, k)^{-1}\sigma_{j-1}^{-1} - (j-1, k)^{-1}(kl)^\varepsilon\sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv \{(kl)^\varepsilon, (j-1, l)^{-1}\}(j-1, k)^{-1}\sigma_{j-1}^{-1} - \{(kl)^\varepsilon, (j-1, l)^{-1}\}(j-1, k)^{-1}\sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(3) $\wedge$ (8)

Let $f = \sigma_{j-1}^{-1}(jk) - (j-1, k)\sigma_{j-1}^{-1}$, $g = (jk)(kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk)$, $j < k < l$. Then $w = \sigma_{j-1}^{-1}(jk)(kl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned} (f, g)_w &= \sigma_{j-1}^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk) - (j-1, k)\sigma_{j-1}^{-1}(kl)^\varepsilon \\ &\equiv \{(kl)^\varepsilon, (j-1, l)(kl)\}(j-1, k)\sigma_{j-1}^{-1} - (j-1, k)(kl)^\varepsilon\sigma_{j-1}^{-1} \\ &\equiv \{(kl)^\varepsilon, (j-1, l)(kl)\}(j-1, k)\sigma_{j-1}^{-1} - \{(kl)^\varepsilon, (j-1, l)(kl)\}(j-1, k)\sigma_{j-1}^{-1} \\ &\equiv 0. \end{aligned}$$

(3) $\wedge$ (9)

Let $f = \sigma_{j-1}^{-1}(jk)^{-1}(j-1, k)^{-1}\sigma_{j-1}^{-1}$, $g = (jk)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1}$, $j < k < l$. Then $w = \sigma_{j-1}^{-1}(jk)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned} (f, g)_w &= \sigma_{j-1}^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - (j-1, k)^{-1}\sigma_{j-1}^{-1}(jl)^\varepsilon \\ &\equiv \{(j-1, l)^\varepsilon, (kl)^{-1}(j-1, l)^{-1}\}(j-1, k)^{-1}\sigma_{j-1}^{-1} - (j-1, k)^{-1}(j-1, l)^\varepsilon\sigma_{j-1}^{-1} \\ &\equiv \{(j-1, l)^\varepsilon, (kl)^{-1}(j-1, l)^{-1}\}(j-1, k)^{-1}\sigma_{j-1}^{-1} - \\ &\quad \{(j-1, l)^\varepsilon, (kl)^{-1}(j-1, l)^{-1}\}(j-1, k)^{-1}\sigma_{j-1}^{-1} \\ &\equiv 0. \end{aligned}$$

(3) $\wedge$ (10)

Let $f = \sigma_{j-1}^{-1}(jk) - (j-1, k)\sigma_{j-1}^{-1}$, $g = (jk)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk)$, $j < k < l$. Then $w = \sigma_{j-1}^{-1}(jk)(jl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned} (f, g)_w &= \sigma_{j-1}^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk) - (j-1, k)\sigma_{j-1}^{-1}(jl)^\varepsilon \\ &\equiv \{(j-1, l)^\varepsilon, (kl)\}(j-1, k)\sigma_{j-1}^{-1} - (j-1, k)(j-1, l)^\varepsilon\sigma_{j-1}^{-1} \\ &\equiv 0. \end{aligned}$$

(3) $\wedge$ (11)

Let $f = \sigma_{i-1}^{-1}(ik)^{-1} - (i-1, k)^{-1}\sigma_{i-1}^{-1}$, $g = (ik)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}$, $i < j < k < l$. Then $w = \sigma_{i-1}^{-1}(ik)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned} (f, g)_w &= \sigma_{i-1}^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} - (i-1, k)^{-1}\sigma_{i-1}^{-1}(jl)^\varepsilon \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (kl)(i-1, l)(kl)^{-1}(i-1, l)^{-1}\}(i-1, k)^{-1}\sigma_{i-1}^{-1} - (i-1, k)^{-1}(jl)^\varepsilon\sigma_{i-1}^{-1} \\ &\equiv 0. \end{aligned}$$

(3) $\wedge$ (12)

Let $f = \sigma_{i-1}^{-1}(ik) - (i-1, k)\sigma_{i-1}^{-1}$, $g = (ik)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik)$, $i < j < k < l$. Then $w = \sigma_{i-1}^{-1}(ik)(jl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned} (f, g)_w &= \sigma_{i-1}^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) - (i-1, k)\sigma_{i-1}^{-1}(jl)^\varepsilon \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (i-1, l)^{-1}(kl)^{-1}(i-1, l)(kl)\}(i-1, k)\sigma_{i-1}^{-1} - (i-1, k)(jl)^\varepsilon\sigma_{i-1}^{-1} \\ &\equiv 0. \end{aligned}$$

(3) $\wedge$ (13)

$f = \sigma_{i-1}^{-1}(ik)^\delta - (i-1, k)^\delta\sigma_{i-1}^{-1}$, $g = (ik)^\delta(jl)^\varepsilon - (jl)^\varepsilon(ik)^\delta$. Then $w = \sigma_{i-1}^{-1}(ik)^\delta(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_{i-1}^{-1}(jl)^\varepsilon(ik)^\delta - (i-1, k)^\delta\sigma_{i-1}^{-1}(jl)^\varepsilon.$$

There are two cases to consider.

1) $j < i < k < l$. In this case, there are two subcases to consider.

a) $i - 1 = j$.

$$\begin{aligned}
& (f, g)_w \\
&= \sigma_{i-1}^{-1}(i-1, l)^\varepsilon (ik)^\delta - (i-1, k)^\delta \sigma_{i-1}^{-1}(i-1, l)^\varepsilon \\
&\equiv \{(il)^\varepsilon, (i-1, i)\}(i-1, k)^\delta \sigma_{i-1}^{-1} - (i-1, k)^\delta \{(il)^\varepsilon, (i-1, i)\} \sigma_{i-1}^{-1} \\
&\equiv (i-1, i)^{-1} (il)^\varepsilon (i-1, i) (i-1, k)^\delta \sigma_{i-1}^{-1} - (i-1, k)^\delta (i-1, l) (il)^\varepsilon (i-1, l)^{-1} \sigma_{i-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

If $\delta = 1$, then

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &\equiv (i-1, l) (il)^\varepsilon (i-1, l)^{-1} (i-1, k)^\delta \sigma_{i-1}^{-1} - \{(i-1, l), (kl)\} \{(il)^\varepsilon, \\
&\quad (i-1, l)^{-1} (kl)^{-1} (i-1, l) (kl)\} \{(i-1, l)^{-1}, (kl)\} (i-1, k)^\delta \sigma_{i-1}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

If $\delta = -1$, then

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &\equiv (i-1, l) (il)^\varepsilon (i-1, l)^{-1} (i-1, k)^\delta \sigma_{i-1}^{-1} - \{(i-1, l), (kl)^{-1} (i-1, l)^{-1}\} \\
&\quad \{(il)^\varepsilon, (kl) (i-1, l) (kl)^{-1} (i-1, l)^{-1}\} \{(i-1, l)^{-1} (kl)^{-1} (i-1, l)^{-1}\} \\
&\quad (i-1, k)^\delta \sigma_{i-1}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

b) $j < i - 1$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_{i-1}^{-1}(jl)^\varepsilon (ik)^\delta - (i-1, k)^\delta \sigma_{i-1}^{-1}(jl)^\varepsilon \\
&\equiv (jl)^\varepsilon (i-1, k)^\delta \sigma_{i-1}^{-1} - (i-1, k)^\delta (jl)^\varepsilon \sigma_{i-1}^{-1} \\
&\equiv (jl)^\varepsilon (i-1, k)^\delta \sigma_{i-1}^{-1} - (jl)^\varepsilon (i-1, k)^\delta \sigma_{i-1}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

2) $i < k < j < l$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_{i-1}^{-1}(jl)^\varepsilon (ik)^\delta - (i-1, k)^\delta \sigma_{i-1}^{-1}(jl)^\varepsilon \\
&\equiv (jl)^\varepsilon (i-1, k)^\delta \sigma_{i-1}^{-1} - (i-1, k)^\delta (jl)^\varepsilon \sigma_{i-1}^{-1} \\
&\equiv (jl)^\varepsilon (i-1, k)^\delta \sigma_{i-1}^{-1} - (jl)^\varepsilon (i-1, k)^\delta \sigma_{i-1}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(4) $\wedge$ (7)

Let $f = \sigma_j^{-1}(jk)^{-1} - \{(j+1, k)^{-1}(j, j+1)\} \sigma_j^{-1}$, $g = (jk)^{-1}(kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\} (jk)^{-1}, j +$

$1 < k < l$. Then $w = \sigma_j^{-1}(jk)^{-1}(kl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_j^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - \{(j+1, k)^{-1}, (j, j+1)\}\sigma_j^{-1}(kl)^\varepsilon \\
&\equiv \{(kl)^\varepsilon, \{(j+1, l)^{-1}, (j, j+1)\}\}\{(j+1, k)^{-1}, (j, j+1)\}\sigma_j^{-1} - \{(j+1, k)^{-1}, \\
&\quad (j, j+1)\}(kl)^\varepsilon\sigma_j^{-1} \\
&\equiv (j, j+1)^{-1}(j+1, l)(j, j+1)(kl)^\varepsilon(j, j+1)^{-1}(j+1, l)^{-1}(j+1, k)^{-1} \\
&\quad (j, j+1)\sigma_j^{-1} - (j, j+1)^{-1}(j+1, k)^{-1}(j, j+1)(kl)^\varepsilon\sigma_j^{-1} \\
&\equiv (jl)(j+1, l)(jl)^{-1}(kl)^\varepsilon(jl)(j+1, l)^{-1}(jl)^{-1}(j, j+1)^{-1}(j+1, k)^{-1} \\
&\quad (j, j+1)\sigma_j^{-1} - (j, j+1)^{-1}(j+1, k)^{-1}(kl)^\varepsilon(j, j+1)\sigma_j^{-1} \\
&\equiv (jl)(j+1, l)(jl)^{-1}(kl)^\varepsilon(jl)(j+1, l)^{-1}(jl)^{-1}(jk)(j+1, k)^{-1}(jk)^{-1}(j, j+1)^{-1} \\
&\quad (j, j+1)\sigma_j^{-1} - (j, j+1)^{-1}(j+1, l)(kl)^\varepsilon(j+1, l)^{-1}(j+1, k)^{-1}(j, j+1)\sigma_j^{-1} \\
&\equiv (jl)(j+1, l)(jl)^{-1}(kl)^\varepsilon(jl)(j+1, l)^{-1}(jl)^{-1}(jk)(j+1, k)^{-1}(jk)^{-1}\sigma_j^{-1} - (jl) \\
&\quad (j+1, l)(jl)^{-1}(kl)^\varepsilon(jl)(j+1, l)^{-1}(jl)^{-1}(j, j+1)^{-1}(j+1, k)^{-1}(j, j+1)\sigma_j^{-1} \\
&\equiv (jl)(j+1, l)(jl)^{-1}(kl)^\varepsilon(jl)(j+1, l)^{-1}(jl)^{-1}(jk)(j+1, k)^{-1}(jk)^{-1}\sigma_j^{-1} \\
&\quad - (jl)(j+1, l)(jl)^{-1}(kl)^\varepsilon(jl)(j+1, l)^{-1}(jl)^{-1}(jk)(j+1, k)^{-1}(jk)^{-1} \\
&\quad (j, j+1)^{-1}(j, j+1)\sigma_j^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(4) $\wedge$ (8)

Let $f = \sigma_j^{-1}(jk) - \{(j+1, k), (j, j+1)\}\sigma_j^{-1}$, $g = (jk)(kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk)$, $j+1 < k < l$. Then $w = \sigma_j^{-1}(jk)(kl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_j^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk) - \{(j+1, k), (j, j+1)\}\sigma_j^{-1}(kl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
&\sigma_j^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk) \\
&\equiv \{(kl)^\varepsilon, \{(j+1, l), (j, j+1)\}\}(kl)\}\{(j+1, k), (j, j+1)\}\sigma_j^{-1} \\
&\equiv (kl)^{-1}(j, j+1)^{-1}(j+1, l)^{-1}(j, j+1)^{-1}(kl)^\varepsilon(j, j+1)^{-1}(j+1, l)(j, j+1)(kl)(j, j+1)^{-1} \\
&\quad (j+1, k)(j, j+1)\sigma_j^{-1} \\
&\equiv (kl)^{-1}(jl)(j+1, l)^{-1}(jl)^{-1}(kl)^\varepsilon(jl)(j+1, l)(jl)^{-1}(kl)(jk)(j+1, k)(jk)^{-1}\sigma_j^{-1} \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\{(j+1, k), (j, j+1)\}\sigma_j^{-1}(kl)^\varepsilon \\
&\equiv (j, j+1)^{-1}(j+1, k)(j, j+1)(kl)^\varepsilon\sigma_j^{-1} \\
&\equiv (j, j+1)^{-1}(j+1, k)(kl)^\varepsilon(j, j+1)\sigma_j^{-1} \\
&\equiv (j, j+1)^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (j+1, l)(kl)\}(j+1, k)(j, j+1)\sigma_j^{-1} \\
&\equiv \{(kl)^\varepsilon, \{(j+1, l), (jl)^{-1}\}\}(kl)\} \cdot \{(j+1, k)(jk)^{-1}\}(j, j+1)^{-1}(j, j+1)\sigma_j^{-1} \\
&\equiv (kl)^{-1}(jl)(j+1, l)^{-1}(jl)^{-1}(kl)^\varepsilon(jl)(j+1, l)(jl)^{-1}(kl)(jk)(j+1, k)(jk)^{-1}\sigma_j^{-1}.
\end{aligned}$$

(4) $\wedge$ (9)

Let $f = \sigma_j^{-1}(jk)^{-1} - \{(j+1, k)^{-1}, (j, j+1)\}\sigma_j^{-1}$, $g = (jk)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1}$, $j+1 < k < l$. Then $w = \sigma_j^{-1}(jk)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$1 < k < l$. Then $w = \sigma_j^{-1}(jk)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_j^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - \{(j+1, k)^{-1}(j, j+1)\}\sigma_j^{-1}(jl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned} & \sigma_j^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1} \\ \equiv & \{ \{(j+1, l)^\varepsilon, (j, j+1)\}, (kl)^{-1}\{(j+1, l)^{-1}, (j, j+1)\} \} \{(j+1, k)^{-1}, (j, j+1)\} \sigma_j^{-1} \\ \equiv & (j, j+1)^{-1}(j+1, l)(j, j+1)(kl)(j, j+1)^{-1}(j+1, l)^\varepsilon(j, j+1)(kl)^{-1}(j, j+1)^{-1} \\ & (j+1, l)^{-1}(j+1, k)^{-1}(j, j+1)\sigma_j^{-1} \\ \equiv & (jl)(j+1, l)(jl)^{-1}(kl)(jl)(j+1, l)^\varepsilon(jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(j+1, l)^{-1}(jl)^{-1}(jk)(j+1, k)^{-1} \\ & (jk)^{-1}\sigma_j^{-1} \quad \text{and} \\ & \{(j+1, k)^{-1}, (j, j+1)\}\sigma_j^{-1}(jl)^\varepsilon \\ \equiv & (j, j+1)^{-1}(j+1, k)^{-1}(j, j+1)(j, j+1)^{-1}(j+1, l)^\varepsilon(j, j+1)\sigma_j^{-1} \\ \equiv & (j, j+1)^{-1}\{(j+1, l)^\varepsilon, (kl)^{-1}(j+1, l)^{-1}\}(j+1, k)^{-1}(j, j+1)\sigma_j^{-1} \\ \equiv & \{ \{(j+1, l)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}, (kl)^{-1}\{(j+1, l)^{-1}, (jl)^{-1}\} \} \{(j+1, k)^{-1}, (jk)^{-1}\} \sigma_j^{-1} \\ \equiv & (jl)(j+1, l)(jl)^{-1}(kl)(jl)(j+1, l)^\varepsilon(jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(j+1, l)^{-1}(jl)^{-1}(jk)(j+1, k)^{-1} \\ & (jk)^{-1}\sigma_j^{-1}. \end{aligned}$$

(4) $\wedge$ (10)

Let $f = \sigma_j^{-1}(jk) - \{(j+1, k), (j, j+1)\}\sigma_j^{-1}$, $g = (jk)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk)$, $j+1 < k < l$. Then $w = \sigma_j^{-1}(jk)(jl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned} (f, g)_w &= \sigma_j^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk) - \{(j+1, k), (j, j+1)\}\sigma_j^{-1}(jl)^\varepsilon \\ &\equiv \{(j+1, l)^\varepsilon, (j, j+1)(kl)\}\{(j+1, k), (j, j+1)\}\sigma_j^{-1} \\ &\quad - (j, j+1)^{-1}(j+1, k)(j+1, l)^\varepsilon(j, j+1)\sigma_j^{-1} \\ &\equiv \{(j+1, l)^\varepsilon, (j, j+1)(kl)\}\{(j+1, k), (j, j+1)\}\sigma_j^{-1} \\ &\quad - (j, j+1)^{-1}\{(j+1, l)^\varepsilon, (kl)\}(j+1, k)(j, j+1)\sigma_j^{-1} \\ &\equiv (kl)^{-1}(jl)(j+1, l)^\varepsilon(jl)^{-1}(kl)(jk)(j+1, k)(jk)^{-1}\sigma_j^{-1} \\ &\quad - (kl)^{-1}(jl)(j+1, l)^\varepsilon(jl)^{-1}(kl)(jk)(j+1, k)(jk)^{-1}\sigma_j^{-1} \\ &\equiv 0. \end{aligned}$$

(4) $\wedge$ (11)

Let $f = \sigma_i^{-1}(ik)^{-1} - \{(i+1, k)^{-1}, (i, i+1)\}\sigma_i^{-1}$, $g = (ik)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}$, $i < j < k < l$. Then $w = \sigma_i^{-1}(ik)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_i^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} - \{(i+1, k)^{-1}, (i, i+1)\}\sigma_i^{-1}(jl)^\varepsilon.$$

There are two cases to consider.

1) $i = j - 1$.

$$\begin{aligned}
& \sigma_{j-1}^{-1} \{ (jl)^\varepsilon, (kl)(j-1, l)(kl)^{-1}(j-1, l)^{-1} \} (j-1, k)^{-1} \\
& \equiv \{ (j-1, l)^\varepsilon, (kl) \{ (jl), (j-1, j) \} (kl)^{-1} \{ (jl)^{-1}, (j-1, j) \} \} \{ (jk)^{-1}, (j-1, j) \} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv (j-1, j)^{-1} (jl)(j-1, j)(kl)(j-1, j)^{-1} (jl)^{-1} (j-1, j)(kl)^{-1} (j-1, l)^\varepsilon (kl) \\
& \quad (j-1, j)^{-1} (jl)(j-1, j)(kl)^{-1} (j-1, j)^{-1} (jl)^{-1} (jk)^{-1} (j-1, j) \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \{ (j-1, l)^\varepsilon, (kl)(j-1, l)(jl)(j-1, l)^{-1} (kl)^{-1} (j-1, l)(jl)^{-1} (j-1, l)^{-1} \} \\
& \quad (j-1, k)(jk)^{-1} (j-1, k)^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \quad \text{and} \\
& \quad \{ (jk)^{-1}, (j-1, j) \} \sigma_{j-1}^{-1} (jl)^\varepsilon \\
& \equiv (j-1, j)^{-1} (jk)^{-1} (j-1, j)(j-1, l)^\varepsilon \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv (j-1, j)^{-1} (jk)^{-1} \{ (j-1, l)^\varepsilon, (jl) \} (j-1, j) \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv (j-1, j)^{-1} \{ (j-1, l)^\varepsilon, \{ (jl), (kl)^{-1} (jl)^{-1} \} \} (jk)^{-1} (j-1, j) \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \{ \{ (j-1, l)^\varepsilon, (jl)^{-1} (j-1, l)^{-1} \}, \{ \{ (jl), (j-1, l)^{-1} \}, (kl)^{-1} \{ (jl)^{-1}, (j-1, l)^{-1} \} \} \} \\
& \quad \{ (jk)^{-1}, (j-1, k)^{-1} \} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \{ (j-1, l)^\varepsilon, (kl)(j-1, l)(jl)(j-1, l)^{-1} (kl)^{-1} (j-1, l)(jl)^{-1} (j-1, l)^{-1} \} \\
& \quad (j-1, k)(jk)^{-1} (j-1, k)^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

2) $i < j - 1$.

$$\begin{aligned}
& \sigma_i^{-1} \{ (jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1} \} (ik)^{-1} \\
& \equiv \{ (jl)^\varepsilon, (kl) \{ (i+1, l), (i, i+1) \} (kl)^{-1} \{ (i+1, l)^{-1}, (i, i+1) \} \} \\
& \quad \{ (i+1, k)^{-1}, (i, i+1) \} \sigma_i^{-1} \\
& \equiv (i, i+1)^{-1} (i+1, l)(i, i+1)(kl)(i, i+1)^{-1} (i+1, l)^{-1} (i, i+1)(kl)^{-1} (jl)^\varepsilon (kl) \\
& \quad (i, i+1)^{-1} (i+1, l)(i, i+1)(kl)^{-1} (i, i+1)^{-1} (i+1, l)^{-1} (i+1, k)^{-1} (i, i+1) \sigma_i^{-1} \\
& \equiv \{ (jl)^\varepsilon, (kl)(il)(i+1, l)(il)^{-1} (kl)^{-1} (il)(i+1, l)^{-1} (il)^{-1} \} \\
& \quad (ik)(i+1, k)^{-1} (ik)^{-1} \sigma_i^{-1} \quad \text{and} \\
& \quad \{ (i+1, k)^{-1}, (i, i+1) \} \sigma_i^{-1} (jl)^\varepsilon \\
& \equiv (i, i+1)^{-1} (i+1, k)^{-1} (i, i+1)(jl)^\varepsilon \sigma_i^{-1} \\
& \equiv (i, i+1)^{-1} (i+1, k)^{-1} (jl)^\varepsilon (i, i+1) \sigma_i^{-1} \\
& \equiv (i, i+1)^{-1} (i+1, l)(kl)(i+1, l)^{-1} (kl)^{-1} (jl)^\varepsilon (kl)(i+1, l)(kl)^{-1} \\
& \quad (i+1, l)^{-1} (i+1, k)^{-1} (i, i+1) \sigma_i^{-1} \\
& \equiv \{ (jl)^\varepsilon, (kl)(il)(i+1, l)(il)^{-1} (kl)^{-1} (il)(i+1, l)^{-1} (il)^{-1} \} \\
& \quad (ik)(i+1, k)^{-1} (ik)^{-1} \sigma_i^{-1}.
\end{aligned}$$

(4) $\wedge$ (12)

Let $f = \sigma_i^{-1}(ik) - \{ (i+1, k), (i, i+1) \} \sigma_i^{-1}$, $g = (ik)(jl)^\varepsilon - \{ (jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \} (ik)$, $i < j < k < l$. Then $w = \sigma_i^{-1}(ik)(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_i^{-1} \{ (jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \} (ik) - \{ (i+1, k), (i, i+1) \} \sigma_i^{-1} (jl)^\varepsilon.$$

There are two cases to consider.

1) $i = j - 1$.

$$\begin{aligned}
& \sigma_{j-1}^{-1} \{ (jl)^\varepsilon, (j-1, l)^{-1} (kl)^{-1} (j-1, l) (kl) \} (j-1, k) \\
& \equiv \{ (j-1, l)^\varepsilon, \{ (jl)^{-1}, (j-1, j) \} (kl)^{-1} \{ (jl), (j-1, j) \} (kl) \} \{ (jk), (j-1, j) \} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv (kl)^{-1} (j-1, j)^{-1} (jl)^{-1} (j-1, j) (kl) (j-1, j)^{-1} (jl) (j-1, j) (j-1, l)^\varepsilon (j-1, j)^{-1} \\
& \quad (jl)^{-1} (j-1, j) (kl)^{-1} (j-1, j)^{-1} (jl) (j-1, j) (kl) (j-1, j)^{-1} (jk) (j-1, j) \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \{ (j-1, l)^\varepsilon, (jl)^{-1} (j-1, l)^{-1} (kl)^{-1} (j-1, l) (jl) (j-1, l)^{-1} (kl) \} \\
& \quad (j-1, k) (jk) (j-1, k)^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \quad \text{and} \\
& \{ (jk), (j-1, j) \} \sigma_{j-1}^{-1} (jl)^\varepsilon \\
& \equiv (j-1, j)^{-1} (jk) (j-1, j) (j-1, l)^\varepsilon \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv (j-1, j)^{-1} (jk) \{ (j-1, l)^\varepsilon, (jl) \} (j-1, j) \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv (j-1, j)^{-1} \{ (j-1, l)^\varepsilon, \{ (jl), (kl) \} \} (jk) (j-1, j) \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \{ \{ (j-1, l)^\varepsilon, (jl)^{-1} (j-1, l)^{-1} \}, \{ \{ (jl), (j-1, l)^{-1} \}, (kl) \} \} \{ (jk), (j-1, k)^{-1} \} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \{ (j-1, l)^\varepsilon, (jl)^{-1} (j-1, l)^{-1} (kl)^{-1} (j-1, l) (jl) (j-1, l)^{-1} (kl) \} \\
& \quad (j-1, k) (jk) (j-1, k)^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

2) $i < j - 1$.

$$\begin{aligned}
& \sigma_i^{-1} \{ (jl)^\varepsilon, (il)^{-1} (kl)^{-1} (il) (kl) \} (ik) \\
& \equiv \{ (jl)^\varepsilon, \{ (i+1, l)^{-1}, (i, i+1) \} (kl)^{-1} \{ (i+1, l) (i, i+1) \} \\
& \quad (kl) \} \{ (i+1, k) (i, i+1) \} \sigma_i^{-1} \\
& \equiv (kl)^{-1} (i, i+1)^{-1} (i+1, l)^{-1} (i, i+1) (kl) (i, i+1)^{-1} (i+1, l) (i, i+1) (jl)^\varepsilon \\
& \quad (i, i+1)^{-1} (i+1, l)^{-1} (i, i+1) (kl)^{-1} (i, i+1)^{-1} (i+1, l) (i, i+1) (kl) \\
& \quad (i, i+1)^{-1} (i+1, k) (i, i+1) \sigma_i^{-1} \\
& \equiv \{ (jl)^\varepsilon, (il) (i+1, l)^{-1} (il)^{-1} (kl)^{-1} (il) (i+1, l) (il)^{-1} (kl) \} (ik) (i+1, k) \\
& \quad (ik)^{-1} \sigma_i^{-1} \quad \text{and} \\
& \{ (i+1, k), (i, i+1) \} \sigma_i^{-1} (jl)^\varepsilon \\
& \equiv (i, i+1)^{-1} (i+1, k) (i, i+1) (jl)^\varepsilon \sigma_i^{-1} \\
& \equiv (i, i+1)^{-1} (i+1, k) (jl)^\varepsilon (i, i+1) \sigma_i^{-1} \\
& \equiv (i, i+1)^{-1} (kl)^{-1} (i+1, l)^{-1} (kl) (i+1, l) (jl)^\varepsilon (i+1, l)^{-1} (kl)^{-1} \\
& \quad (i+1, l) (kl) (i+1, k) (i, i+1) \sigma_i^{-1} \\
& \equiv \{ (jl)^\varepsilon, (il) (i+1, l)^{-1} (il)^{-1} (kl)^{-1} (il) (i+1, l) (il)^{-1} (kl) \} (ik) (i+1, k) \\
& \quad (ik)^{-1} \sigma_i^{-1}.
\end{aligned}$$

(4) $\wedge$ (13)

Let $f = \sigma_i^{-1} (ik)^\delta - \{ (i+1, k)^\delta, (i, i+1) \} \sigma_i^{-1}$, $g = (ik)^\delta (jl)^\varepsilon - (jl)^\varepsilon (ik)^\delta$, $j < i < i+1 < k < l$, or, $i < i+1 < k < l$. Then $w = \sigma_i^{-1} (ik)^\delta (jl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_i^{-1} (jl)^\varepsilon (ik)^\delta - \{ (i+1, k)^\delta, (i, i+1) \} \sigma_i^{-1} (jl)^\varepsilon \\
&\equiv (jl)^\varepsilon \{ (i+1, k)^\delta, (i, i+1) \} \sigma_i^{-1} - (jl)^\varepsilon \{ (i+1, k)^\delta, (i, i+1) \} \sigma_i^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(5) $\wedge$ (7)

Let $f = \sigma_{k-1}^{-1}(jk)^{-1} - (j, k-1)^{-1}\sigma_{k-1}^{-1}$, $g = (jk)^{-1}(kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1}$, $j < k-1 < k < l$. Then $w = \sigma_{k-1}^{-1}(jk)^{-1}(kl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned}(f, g)_w &= \sigma_{k-1}^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - (j, k-1)^{-1}\sigma_{k-1}^{-1}(kl)^\varepsilon \\ &\equiv \{(k-1, l)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(j, k-1)^{-1}\sigma_{k-1}^{-1} - (j, k-1)^{-1}(k-1, l)^\varepsilon\sigma_{k-1}^{-1} \\ &\equiv 0.\end{aligned}$$

(5) $\wedge$ (8)

Let $f = \sigma_{k-1}^{-1}(jk) - (j, k-1)\sigma_{k-1}^{-1}$, $g = (jk)(kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk)$, $j < k-1 < k < l$. Then $w = \sigma_{k-1}^{-1}(jk)(kl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned}(f, g)_w &= \sigma_{k-1}^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk) - (j, k-1)\sigma_{k-1}^{-1}(kl)^\varepsilon \\ &\equiv \{(k-1, l)^\varepsilon, (jl)(k-1, l)\}(j, k-1)\sigma_{k-1}^{-1} - (j, k-1)(k-1, l)^\varepsilon\sigma_{k-1}^{-1} \\ &\equiv 0.\end{aligned}$$

(5) $\wedge$ (9)

Let $f = \sigma_{k-1}^{-1}(jk)^{-1} - (j, k-1)^{-1}\sigma_{k-1}^{-1}$, $g = (jk)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1}$, $j < k-1 < k < l$. Then $w = \sigma_{k-1}^{-1}(jk)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned}(f, g)_w &= \sigma_{k-1}^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - (j, k-1)^{-1}\sigma_{k-1}^{-1}(jl)^\varepsilon \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (k-1, l)^{-1}(jl)^{-1}\}(j, k-1)^{-1}\sigma_{k-1}^{-1} - (j, k-1)^{-1}(jl)^\varepsilon\sigma_{k-1}^{-1} \\ &\equiv 0.\end{aligned}$$

(5) $\wedge$ (10)

Let $f = \sigma_{k-1}^{-1}(jk) - (j, k-1)\sigma_{k-1}^{-1}$, $g = (jk)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk)$, $j < k-1 < k < l$. Then $w = \sigma_{k-1}^{-1}(jk)(jl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned}(f, g)_w &= \sigma_{k-1}^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk) - (j, k-1)\sigma_{k-1}^{-1}(jl)^\varepsilon \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (k-1, l)\}(j, k-1)\sigma_{k-1}^{-1} - (j, k-1)(jl)^\varepsilon\sigma_{k-1}^{-1} \\ &\equiv 0.\end{aligned}$$

(5) $\wedge$ (11)

Let $f = \sigma_{k-1}^{-1}(ik)^{-1} - (i, k-1)^{-1}\sigma_{k-1}^{-1}$, $g = (ik)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}$, $i < j < k < l$. Then $w = \sigma_{k-1}^{-1}(ik)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_{k-1}^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} - (i, k-1)^{-1}\sigma_{k-1}^{-1}(jl)^\varepsilon.$$

There are two cases to consider.

1) $j = k - 1$.

$$\begin{aligned}
& \sigma_{k-1}^{-1} \{ (k-1, l)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1} \} (ik)^{-1} \\
\equiv & \{ \{ (kl)^\varepsilon, (k-1, k) \}, (k-1, l)(il)(k-1, l)^{-1}(il)^{-1} \} (i, k-1)^{-1} \sigma_{k-1}^{-1} \\
\equiv & (il)(k-1, l)(il)^{-1}(k-1, l)^{-1}(k-1, k)^{-1}(kl)^\varepsilon(k-1, k)(k-1, l)(il) \\
& (k-1, l)^{-1}(il)^{-1}(i, k-1)^{-1} \sigma_{k-1}^{-1} \\
\equiv & (il)(k-1, l)(il)^{-1}(kl)^\varepsilon(il)(k-1, l)^{-1}(il)^{-1}(i, k-1)^{-1} \sigma_{k-1}^{-1} \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (i, k-1)^{-1} \sigma_{k-1}^{-1} (k-1, l)^\varepsilon \\
\equiv & (i, k-1)^{-1} \{ (kl)^\varepsilon, (k-1, k) \} \sigma_{k-1}^{-1} \\
\equiv & \{ (kl)^\varepsilon, \{ (k-1, k), (ik)^{-1} \} (i, k-1)^{-1} \sigma_{k-1}^{-1} \} \\
\equiv & (ik)(k-1, k)^{-1}(ik)^{-1}(kl)^\varepsilon(ik)(k-1, k)(ik)^{-1}(i, k-1)^{-1} \sigma_{k-1}^{-1} \\
\equiv & (ik)(k-1, k)^{-1} \{ (kl)^\varepsilon, (il)^{-1} \} (k-1, k)(ik)^{-1}(i, k-1)^{-1} \sigma_{k-1}^{-1} \\
\equiv & (ik) \{ \{ (kl)^\varepsilon, (k-1, l)^{-1} \}, (il)^{-1} \} (ik)^{-1}(i, k-1)^{-1} \sigma_{k-1}^{-1} \\
\equiv & \{ \{ \{ (kl)^\varepsilon, (il)(kl) \}, \{ (k-1, l)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \} \}, \{ (il)^{-1}, (kl) \} \} \\
& (i, k-1)^{-1} \sigma_{k-1}^{-1} \\
\equiv & (il)(k-1, l)(il)^{-1}(kl)^\varepsilon(il)(k-1, l)^{-1}(il)^{-1}(i, k-1)^{-1} \sigma_{k-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

2) $j < k - 1$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_{k-1}^{-1} \{ (jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1} \} (ik)^{-1} - (i, k-1)^{-1} \sigma_{k-1}^{-1} (jl)^\varepsilon \\
&\equiv \{ (jl)^\varepsilon, (k-1, l)(il)(k-1, l)^{-1}(il)^{-1} \} (i, k-1)^{-1} \sigma_{k-1}^{-1} - (i, k-1)^{-1} \\
&\quad (jl)^\varepsilon \sigma_{k-1}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(5) $\wedge$ (12)

Let $f = \sigma_{k-1}^{-1}(ik) - (i, k-1)\sigma_{k-1}^{-1}$, $g = (ik)(jl)^\varepsilon - \{ (jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \} (ik)$, $i < j < k < l$. Then $w = \sigma_{k-1}^{-1}(ik)(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_{k-1}^{-1} \{ (jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \} (ik) - (i, k-1)\sigma_{k-1}^{-1}(jl)^\varepsilon.$$

There are two cases to consider.

1) $j = k - 1$.

$$\begin{aligned}
& \sigma_{k-1}^{-1} \{ (k-1, l)^\varepsilon, (il)^{-1} (kl)^{-1} (il) (kl) \} (ik) \\
& \equiv \{ \{ (kl)^\varepsilon, (k-1, k) \} (il)^{-1} (k-1, l)^{-1} (il) (k-1, l) \} (i, k-1) \sigma_{k-1}^{-1} \\
& \equiv \{ (kl)^\varepsilon, (k-1, l)^{-1} (il)^{-1} (k-1, l)^{-1} (il) (k-1, l) \} (i, k-1) \sigma_{k-1}^{-1} \quad \text{and} \\
& (i, k-1) \sigma_{k-1}^{-1} (k-1, l)^\varepsilon \\
& \equiv (i, k-1) \{ (kl)^\varepsilon, (k-1, k) \} \sigma_{k-1}^{-1} \\
& \equiv \{ (kl)^\varepsilon, \{ (k-1, k) (ik) (k-1, k) \} \} (i, k-1) \sigma_{k-1}^{-1} \\
& \equiv (k-1, k)^{-1} (ik)^{-1} (k-1, k)^{-1} (ik) (k-1, k) (kl)^\varepsilon (k-1, k)^{-1} (ik)^{-1} (k-1, k) (ik) \\
& \quad (k-1, k) (i, k-1) \sigma_{k-1}^{-1} \\
& \equiv (k-1, k)^{-1} (ik)^{-1} (k-1, k)^{-1} (ik) \{ (kl)^\varepsilon, (k-1, l) (kl) \} (ik)^{-1} (k-1, k) (ik) (k-1, k) \\
& \quad (i, k-1) \sigma_{k-1}^{-1} \\
& \equiv (k-1, k)^{-1} (ik)^{-1} (k-1, k)^{-1} \{ \{ (kl)^\varepsilon, (il) (kl) \}, \{ (k-1, l), (il)^{-1} (kl)^{-1} (il) (kl) \} \\
& \quad \{ (kl), (il) (kl) \} \} (k-1, k) (ik) (k-1, k) (i, k-1) \sigma_{k-1}^{-1} \\
& \equiv (k-1, k)^{-1} (ik)^{-1} \{ \{ (kl)^\varepsilon, (k-1, l)^{-1} \}, (il) \{ (k-1, l), (kl)^{-1} (k-1, l)^{-1} \} \\
& \quad \{ (kl), (k-1, l)^{-1} \} \} (ik) (k-1, k) (i, k-1) \sigma_{k-1}^{-1} \\
& \equiv (k-1, k)^{-1} \{ \{ \{ (kl)^\varepsilon, (il)^{-1} \}, \{ (k-1, l)^{-1}, (kl) (il) (kl)^{-1} (il)^{-1} \} \}, \{ (il), (kl)^{-1} \\
& \quad (il)^{-1} \} \{ (k-1, l) (kl) (il) (kl)^{-1} (il)^{-1} \} \{ (kl) (il)^{-1} \} \} (k-1, k) (i, k-1) \sigma_{k-1}^{-1} \\
& \equiv \{ \{ (kl)^\varepsilon, (k-1, l)^{-1} \}, \{ \{ (k-1, l)^{-1}, (kl)^{-1} (k-1, l)^{-1} \}, \{ (kl), (k-1, l)^{-1} \} (il) \} \\
& \quad \{ \{ (k-1, l), (kl)^{-1} (k-1, l)^{-1} \}, \{ (kl), (k-1, l)^{-1} \} \} (i, k-1) \sigma_{k-1}^{-1} \\
& \equiv \{ (kl)^\varepsilon, (k-1, l)^{-1} (il)^{-1} (k-1, l)^{-1} (il) (k-1, l) \} (i, k-1) \sigma_{k-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

2) $j < k - 1$.

$$(f, g)_w = \{ (jl)^\varepsilon, (il)^{-1} (k-1, l)^{-1} (il) (k-1, l) \} (i, k-1) \sigma_{k-1}^{-1} - (i, k-1) (jl)^\varepsilon \sigma_{k-1}^{-1} \equiv 0.$$

(5) $\wedge$ (13)

Let $f = \sigma_{k-1}^{-1} (ik)^\delta - (i, k-1)^\delta \sigma_{k-1}^{-1}$, $g = (ik)^\delta (jl)^\varepsilon - (jl)^\varepsilon (ik)^\delta$, $j < i < k-1 < k < l$ or $i < k-1 < k < j < l$. Then $w = \sigma_{k-1}^{-1} (ik)^\delta (jl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_{k-1}^{-1} (jl)^\varepsilon (ik)^\delta - (i, k-1)^\delta \sigma_{k-1}^{-1} (jl)^\varepsilon \\
&\equiv (jl)^\varepsilon (i, k-1)^\delta \sigma_{k-1}^{-1} - (i, k-1)^\delta (jl)^\varepsilon \sigma_{k-1}^{-1} \\
&\equiv (jl)^\varepsilon (i, k-1)^\delta \sigma_{k-1}^{-1} - (jl)^\varepsilon (i, k-1)^\delta \sigma_{k-1}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(6) $\wedge$ (7)

Let $f = \sigma_k^{-1} (jk)^{-1} - \{ (j, k+1)^{-1}, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1}$, $g = (jk)^{-1} (kl)^\varepsilon - \{ (kl)^\varepsilon, (jl)^{-1} \} (jk)^{-1}$, $j < k < l$. Then $w = \sigma_k^{-1} (jk)^{-1} (kl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_k^{-1} \{ (kl)^\varepsilon, (jl)^{-1} \} (jk)^{-1} - \{ (j, k+1)^{-1}, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1} (kl)^\varepsilon.$$

There are two cases to consider.

1) $k = l - 1$.

$$\begin{aligned}
& \sigma_k^{-1}\{(k, k+1)^\varepsilon, (j, k+1)^{-1}\}(jk)^{-1} \\
& \equiv \{(k, k+1)^\varepsilon, (jk)^{-1}\}\{(j, k+1)^{-1}, (k, k+1)\}\sigma_k^{-1} \\
& \equiv (jk)(k, k+1)^\varepsilon(jk)^{-1}(k, k+1)^{-1}, (j, k+1)^{-1}(k, k+1)\sigma_k^{-1} \\
& \equiv (k, k+1)^{-1}(j, k+1)^{-1}(k, k+1)^\varepsilon(k, k+1)\sigma_k^{-1} \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \{(j, k+1)^{-1}, (k, k+1)\}\sigma_k^{-1}(kl)^\varepsilon \\
& \equiv (k, k+1)^{-1}(j, k+1)^{-1}(k, k+1)(k, k+1)^\varepsilon\sigma_k^{-1} \\
& \equiv (k, k+1)^{-1}(j, k+1)^{-1}(k, k+1)^\varepsilon(k, k+1)\sigma_k^{-1}.
\end{aligned}$$

2) $k < l - 1$, then $j < k < k+1 < l$.

$$\begin{aligned}
& \sigma_k^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1} \\
& \equiv \{\{(k+1, l)^\varepsilon, (k, k+1)\}, (jl)^{-1}\}\{(j, k+1)^{-1}, (k, k+1)\}\sigma_k^{-1} \\
& \equiv (jl)(k, k+1)^{-1}(k+1, l)^\varepsilon(k, k+1)(jl)^{-1}(k, k+1)^{-1}(j, k+1)^{-1}(k, k+1)\sigma_k^{-1} \\
& \equiv (jl)(kl)(k+1, l)^\varepsilon(kl)^{-1}(jl)^{-1}(k, k+1)^{-1}(j, k+1)^{-1}(k, k+1)\sigma_k^{-1} \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \{(j, k+1)^{-1}, (k, k+1)\}\sigma_k^{-1}(kl)^\varepsilon \\
& \equiv (k, k+1)^{-1}(j, k+1)^{-1}(k, k+1)(k, k+1)^{-1}(k+1, l)^\varepsilon(k, k+1)\sigma_k^{-1} \\
& \equiv (k, k+1)^{-1}\{(k+1, l)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(j, k+1)^{-1}(k, k+1)\sigma_k^{-1} \\
& \equiv \{\{(k+1, l)^\varepsilon, (kl)^{-1}\}, (jl)^{-1}\}(k, k+1)^{-1}(j, k+1)^{-1}(k, k+1)\sigma_k^{-1} \\
& \equiv (jl)(kl)(k+1, l)^\varepsilon(kl)^{-1}(jl)^{-1}(k, k+1)^{-1}(j, k+1)^{-1}(k, k+1)\sigma_k^{-1}.
\end{aligned}$$

(6) $\wedge$ (8)

Let $f = \sigma_k^{-1}(jk) - \{(j, k+1), (k, k+1)\}\sigma_k^{-1}$, $g = (jk)(kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk)$, $j < k < l$.
Then $w = \sigma_k^{-1}(jk)(kl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_k^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk) - \{(j, k+1), (k, k+1)\}\sigma_k^{-1}(kl)^\varepsilon.$$

There are two cases to consider.

1) $l = k + 1$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_k^{-1}\{(k, k+1)^\varepsilon, (j, k+1)(k, k+1)\}(jk) - \{(j, k+1), (k, k+1)\}\sigma_k^{-1} \\
& \quad (k, k+1)^\varepsilon \\
& \equiv \{(k, k+1)^\varepsilon, (jk)(k, k+1)\}\{(j, k+1)(k, k+1)\}\sigma_k^{-1} \\
& \quad - (k, k+1)^{-1}(j, k+1), (k, k+1)(k, k+1)^\varepsilon\sigma_k^{-1} \\
& \equiv (k, k+1)^{-1}(jk)^{-1}(k, k+1)^\varepsilon(jk)(j, k+1)(k, k+1)\sigma_k^{-1} - (k, k+1)^{-1} \\
& \quad (j, k+1), (k, k+1)^{\varepsilon+1}\sigma_k^{-1} \\
& \equiv (k, k+1)^{-1}(j, k+1)(k, k+1)^{\varepsilon+1}\sigma_k^{-1} - (k, k+1)^{-1}(j, k+1) \\
& \quad (k, k+1)^{\varepsilon+1}\sigma_k^{-1} \\
& \equiv 0.
\end{aligned}$$

2) $l < k + 1, j < k < k + 1 < l$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \{ \{ (k+1, l)^\varepsilon, (k, k+1) \}, (jl) \{ (k+1, l), (k, k+1) \} \} \{ (j, k+1), \\
&\quad (k, k+1) \} \sigma_k^{-1} - (k, k+1)^{-1} (j, k+1) (k+1, l)^\varepsilon (k, k+1) \sigma_k^{-1} \\
&\equiv (k, k+1)^{-1} (k+1, l)^{-1} (k, k+1) (jl)^{-1} (jl) (k, k+1)^{-1} (k+1, l) \\
&\quad (j, k+1) (k, k+1) \sigma_k^{-1} - (k, k+1)^{-1} \{ (k+1, l)^\varepsilon, (jl) \\
&\quad (k+1, l) \} (j, k+1) (k, k+1) \sigma_k^{-1} \\
&\equiv \{ \{ (k+1, l)^\varepsilon, (kl)^{-1} \}, (jl) \{ (k+1, l) (kl)^{-1} \} \} (k, k+1)^{-1} (j, k+1) \\
&\quad (k, k+1) \sigma_k^{-1} - \{ \{ (k+1, l)^\varepsilon, (kl)^{-1} \}, (jl) \{ (k+1, l) (kl)^{-1} \} \} \\
&\quad (k, k+1)^{-1} (j, k+1) (k, k+1) \sigma_k^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(6) $\wedge$ (9)

Let $f = \sigma_k^{-1} (jk)^{-1} - \{ (j, k+1)^{-1}, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1}$, $g = (jk)^{-1} (jl)^\varepsilon - \{ (jl)^\varepsilon, (kl)^{-1} (jl)^{-1} \} (jk)^{-1}$, $j < k < l$. Then $w = \sigma_k^{-1} (jk)^{-1} (jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_k^{-1} \{ (jl)^\varepsilon, (kl)^{-1} (jl)^{-1} \} (jk)^{-1} - \{ (j, k+1)^{-1}, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1} (jl)^\varepsilon.$$

There are two cases to consider.

1) $k = l - 1$.

$$\begin{aligned}
&\sigma_k^{-1} \{ (j, k+1)^\varepsilon, (k, k+1)^{-1} (j, k+1)^{-1} \} (jk)^{-1} \\
&\equiv \{ (jk)^\varepsilon, (k, k+1)^{-1} (jk)^{-1} \} \{ (j, k+1)^{-1} (k, k+1) \} \sigma_k^{-1} \\
&\equiv (jk) (k, k+1) (jk)^\varepsilon (k, k+1)^{-1} (jk)^{-1} (k, k+1)^{-1} (j, k+1)^{-1} (k, k+1) \sigma_k^{-1}.
\end{aligned}$$

If $\varepsilon = 1$, then

$$\begin{aligned}
&\sigma_k^{-1} \{ (j, k+1)^\varepsilon, (k, k+1)^{-1} (j, k+1)^{-1} \} (jk)^{-1} \\
&\equiv (jk) (j, k+1)^{-1} \sigma_k^{-1} \equiv (k, k+1)^{-1} (j, k+1)^{-1} (k, k+1) (jk) \sigma_k^{-1}.
\end{aligned}$$

If $\varepsilon = -1$, then

$$\begin{aligned}
&\sigma_k^{-1} \{ (j, k+1)^\varepsilon, (k, k+1)^{-1} (j, k+1)^{-1} \} (jk)^{-1} \\
&\equiv (k, k+1)^{-1} (j, k+1)^{-1} (k, k+1) (j, k+1) (jk)^{-1} (k, k+1)^{-1} (j, k+1)^{-1} (k, k+1) \sigma_k^{-1} \\
&\equiv (k, k+1)^{-1} (j, k+1)^{-1} (k, k+1) (j, k+1) (j, k+1) (k, k+1)^{-1} (j, k+1)^{-1} (jk)^{-1} \\
&\quad (j, k+1)^{-1} (k, k+1) \sigma_k^{-1} \\
&\equiv (k, k+1)^{-1} (j, k+1)^{-1} (k, k+1) (jk)^{-1} \sigma_k^{-1}.
\end{aligned}$$

Hence,

$$\begin{aligned}
&\sigma_k^{-1} \{ (j, k+1)^\varepsilon, (k, k+1)^{-1} (j, k+1)^{-1} \} (jk)^{-1} \\
&\equiv (k, k+1)^{-1} (j, k+1)^{-1} (k, k+1) (jk)^\varepsilon \sigma_k^{-1} \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\{ (j, k+1)^{-1}, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1} (j, k+1)^\varepsilon \\
&\equiv (k, k+1)^{-1} (j, k+1)^{-1} (k, k+1) (jk)^\varepsilon \sigma_k^{-1}.
\end{aligned}$$

2) $k < l - 1, j < k < k + 1 < l$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \{(jl)^\varepsilon, \{(k+1, l)^{-1}, (k, k+1)\}(jl)^{-1}\}\{(j, k+1)^{-1}, (k, k+1)\}\sigma_k^{-1} \\
&\quad - (k, k+1)^{-1}(j, k+1)^{-1}(k, k+1)(jl)^\varepsilon\sigma_k^{-1} \\
&\equiv (jl)(k, k+1)^{-1}(k+1, l)(k, k+1)(jl)^\varepsilon(k, k+1)^{-1}(k+1, l)^{-1} \\
&\quad (k, k+1)(jl)^{-1}(k, k+1)^{-1}(j, k+1)^{-1}(k, k+1)\sigma_k^{-1} - (k, k+1)^{-1} \\
&\quad (j, k+1)^{-1}(jl)^\varepsilon(k, k+1)\sigma_k^{-1} \\
&\equiv (jl)(kl)(k+1, l)(kl)^{-1}(jl)^\varepsilon(kl)(k+1, l)^{-1}(kl)^{-1}(jl)^{-1}(j, k+1)^{-1}\sigma_k^{-1} \\
&\quad - (k, k+1)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (k+1, l)^{-1}(jl)^{-1}\}(j, k+1)^{-1}(k, k+1)\sigma_k^{-1} \\
&\equiv (jl)(kl)(k+1, l)(kl)^{-1}(jl)^\varepsilon(kl)(k+1, l)^{-1}(kl)^{-1}(jl)^{-1}(j, k+1)^{-1}\sigma_k^{-1} \\
&\quad - \{(jl)^\varepsilon, \{(k+1, l)^{-1}, (kl)^{-1}\}(jl)^{-1}\}(k, k+1)^{-1}(j, k+1)^{-1}(k, k+1)\sigma_k^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(6) $\wedge$ (10)

Let $f = \sigma_k^{-1}(jk) - \{(j, k+1), (k, k+1)\}\sigma_k^{-1}$, $g = (jk)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk)$, $j < k < l$.
Then $w = \sigma_k^{-1}(jk)(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_k^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk) - \{(j, k+1), (k, k+1)\}\sigma_k^{-1}(jl)^\varepsilon.$$

There are two cases to consider.

1) $l = k + 1$.

$$\begin{aligned}
&\sigma_k^{-1}\{(j, k+1)^\varepsilon, (k, k+1)\}(jk) \\
&\equiv \{(jk)^\varepsilon, (k, k+1)\}\{(j, k+1), (k, k+1)\}\sigma_k^{-1} \\
&\equiv (k, k+1)^{-1}(jk)^\varepsilon(j, k+1)(k, k+1)\sigma_k^{-1}.
\end{aligned}$$

If $\varepsilon = 1$, then

$$\begin{aligned}
&\sigma_k^{-1}\{(j, k+1)^\varepsilon, (k, k+1)\}(jk) \\
&\equiv (k, k+1)^{-1}(k, k+1)^{-1}(j, k+1)(k, k+1)(jk)(k, k+1)\sigma_k^{-1} \\
&\equiv (k, k+1)^{-1}(j, k+1)(k, k+1)(jk)\sigma_k^{-1}.
\end{aligned}$$

If $\varepsilon = -1$, then

$$\begin{aligned}
&\sigma_k^{-1}\{(j, k+1)^\varepsilon, (k, k+1)\}(jk) \\
&\equiv (k, k+1)^{-1}(j, k+1)(k, k+1)(j, k+1)(k, k+1)^{-1}(j, k+1)^{-1}(jk)^{-1}(k, k+1)\sigma_k^{-1} \\
&\equiv (k, k+1)^{-1}(j, k+1)(k, k+1)(jk)^{-1}\sigma_k^{-1}.
\end{aligned}$$

Hence,

$$\sigma_k^{-1}\{(j, k+1)^\varepsilon, (k, k+1)\}(jk) \equiv (k, k+1)^{-1}(j, k+1)(k, k+1)(jk)^\varepsilon\sigma_k^{-1}.$$

Also,

$$\{(j, k+1), (k, k+1)\}\sigma_k^{-1}(j, k+1)^\varepsilon \equiv (k, k+1)^{-1}(j, k+1)(k, k+1)(jk)^\varepsilon\sigma_k^{-1}.$$

2) $l < k + 1$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &\equiv \{(jl)^\varepsilon, \{(k+1, l), (k, k+1)\}\} \{(j, k+1), (k, k+1)\} \\
&\quad - (k, k+1)^{-1}(j, k+1)(k, k+1)(jl)^\varepsilon \sigma_k^{-1} \\
&\equiv (k, k+1)^{-1}(k+1, l)^{-1}(k, k+1)(jl)^\varepsilon (k, k+1)^{-1}(k+1, l)(j, k+1)(k, k+1) \\
&\quad - (k, k+1)^{-1}(j, k+1)(jl)^\varepsilon (k, k+1) \sigma_k^{-1} \\
&\equiv (kl)(k+1, l)^{-1}(kl)^{-1}(jl)^\varepsilon (kl)(k+1, l)(kl)^{-1}(k, k+1)^{-1}(j, k+1)(k, k+1) \\
&\quad - (k, k+1)^{-1} \{(jl)^\varepsilon, (k+1, l)\} (j, k+1)(k, k+1) \sigma_k^{-1} \\
&\equiv (kl)(k+1, l)^{-1}(kl)^{-1}(jl)^\varepsilon (kl)(k+1, l)(kl)^{-1}(k, k+1)^{-1}(j, k+1)(k, k+1) \\
&\quad - \{(jl)^\varepsilon, \{(k+1, l), (kl)^{-1}\}\} (k, k+1)^{-1}(j, k+1)(k, k+1) \sigma_k^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(6) $\wedge$ (11)

Let $f = \sigma_k^{-1}(ik)^{-1} - \{(i, k+1)^{-1}, (k, k+1)\} \sigma_k^{-1}$, $g = (ik)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\} (ik)^{-1}$, $i < j < k < l$. Then $w = \sigma_k^{-1}(ik)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_k^{-1} \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\} (ik)^{-1} - \{(i, k+1)^{-1}, (k, k+1)\} \sigma_k^{-1} (jl)^\varepsilon.$$

There are two cases to consider.

1) $k = l - 1$.

$$\begin{aligned}
&\sigma_k^{-1} \{(j, k+1)^\varepsilon, (k, k+1)(i, k+1)(k, k+1)^{-1}(i, k+1)^{-1}\} (ik)^{-1} \\
&\equiv \{(jk)^\varepsilon, (k, k+1)(ik)(k, k+1)^{-1}(ik)^{-1}\} \{(i, k+1)^{-1}, (k, k+1)\} \sigma_k^{-1} \\
&\equiv (ik)(k, k+1)(ik)^{-1}(k, k+1)^{-1}(jk)^\varepsilon (k, k+1)(ik)(k, k+1)^{-1}(ik)^{-1}(k, k+1)^{-1} \\
&\quad (i, k+1)^{-1}(k, k+1) \sigma_k^{-1} \\
&\equiv (k, k+1)^{-1}(i, k+1)^{-1}(k, k+1)(i, k+1)(jk)^\varepsilon (k, k+1)(k, k+1)^{-1}(i, k+1)^{-1} \\
&\quad (k, k+1)^{-1}(i, k+1)(k, k+1)(k, k+1)^{-1}(i, k+1)^{-1}(k, k+1) \sigma_k^{-1} \\
&\equiv (k, k+1)^{-1}(i, k+1)^{-1}(k, k+1)(jk)^\varepsilon \sigma_k^{-1} \quad \text{and} \\
&\quad \{(i, k+1)^{-1}, (k, k+1)\} \sigma_k^{-1} (j, k+1)^\varepsilon \\
&\equiv (k, k+1)^{-1}(i, k+1)^{-1}(k, k+1)(jk)^\varepsilon \sigma_k^{-1}.
\end{aligned}$$

2) $k < l + 1$, $i < j < k < k + 1 < l$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &\equiv \{(jl)^\varepsilon, \{(k+1, l), (k, k+1)\}\} (il) \{(k+1, l)^{-1}, (k, k+1)\} (il)^{-1} \\
&\quad \{(i, k+1)^{-1}, (k, k+1)\} \sigma_k^{-1} - (k, k+1)^{-1}(i, k+1)^{-1}(k, k+1)(jl)^\varepsilon \sigma_k^{-1} \\
&\equiv \{(jl)^\varepsilon, \{(k+1, l), (kl)^{-1}\}\} (il) \{(k+1, l)^{-1}, (kl)^{-1}\} (il)^{-1} \{(k, k+1)^{-1} \\
&\quad (i, k+1)^{-1}(k, k+1) \sigma_k^{-1} \\
&\quad - \{(jl)^\varepsilon, \{(k+1, l), (kl)^{-1}\}\} (il) \{(k+1, l)^{-1}, (kl)^{-1}\} (il)^{-1} \{(k, k+1)^{-1} \\
&\quad (i, k+1)^{-1}(k, k+1) \sigma_k^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(6) $\wedge$ (12)

Let $f = \sigma_k^{-1}(ik) - \{(i, k+1), (k, k+1)\}\sigma_k^{-1}$, $g = (ik)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik)$, $i < j < k < l$. Then $w = \sigma_k^{-1}(ik)(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_k^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) - \{(i, k+1), (k, k+1)\}\sigma_k^{-1}(jl)^\varepsilon.$$

There are two cases to consider.

1) $k = l - 1, i < j < k < l = k + 1$.

$$\begin{aligned} & \sigma_k^{-1}\{(j, k+1)^\varepsilon, (i, k+1)^{-1}(k, k+1)^{-1}(i, k+1)(k, k+1)\}(ik) \\ \equiv & \{(jk)^\varepsilon, (ik)^{-1}(k, k+1)^{-1}(ik)(k, k+1)\}\{(i, k+1), (k, k+1)\}\sigma_k^{-1} \\ \equiv & (k, k+1)^{-1}(ik)^{-1}(k, k+1)(ik)(jk)^\varepsilon(ik)^{-1}(k, k+1)^{-1}(ik)(i, k+1)(k, k+1)\sigma_k^{-1} \\ \equiv & (k, k+1)^{-1}(i, k+1)(k, k+1)(i, k+1)^{-1}(jk)^\varepsilon(i, k+1)\sigma_k^{-1} \\ \equiv & (k, k+1)^{-1}(i, k+1)(k, k+1)(jk)^\varepsilon\sigma_k^{-1} \quad \text{and} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \{(i, k+1), (k, k+1)\}\sigma_k^{-1}(j, k+1)^\varepsilon \\ \equiv & (k, k+1)^{-1}(i, k+1)(k, k+1)(jk)^\varepsilon\sigma_k^{-1}. \end{aligned}$$

2) $k < l - 1, i < j < k < k + 1 < l$.

$$\begin{aligned} & \sigma_k^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) \\ \equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}\{(k+1, l)^{-1}, (k, k+1)\}(il)\{(k+1, l), (k, k+1)\}\} \\ & \{(i, k+1), (k, k+1)\}\sigma_k^{-1} \quad \text{and} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \{(i, k+1), (k, k+1)\}\sigma_k^{-1}(jl)^\varepsilon \\ \equiv & (k, k+1)^{-1}(i, k+1)(k, k+1)(jl)^\varepsilon\sigma_k^{-1} \\ \equiv & (k, k+1)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(k+1, l)^{-1}(il)(k+1, l)\}(i, k+1)(k, k+1)\sigma_k^{-1} \\ \equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}\{(k+1, l)^{-1}, (k, k+1)\}(il)\{(k+1, l), (k, k+1)\}\} \\ & \{(i, k+1), (k, k+1)\}\sigma_k^{-1}. \end{aligned}$$

(6) $\wedge$ (13)

Let $f = \sigma_k^{-1}(ik)^\delta - \{(i, k+1)^\delta, (k, k+1)\}\sigma_k^{-1}$, $g = (ik)^\delta(jl)^\varepsilon - (jl)^\varepsilon(ik)^\delta$, $j < i < k < l$. Then $w = \sigma_k^{-1}(ik)^\delta(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_k^{-1}(jl)^\varepsilon(ik)^\delta - \{(i, k+1)^\delta, (k, k+1)\}\sigma_k^{-1}(jl)^\varepsilon.$$

There are two cases to consider.

1) $k = l - 1, j < i < k < l = k + 1$.

$$\sigma_k^{-1}(j, k+1)^\varepsilon(ik)^\delta \equiv (jk)^\varepsilon\{(i, k+1)^\delta, (k, k+1)\}\sigma_k^{-1}.$$

If $\varepsilon = 1$, then

$$\begin{aligned} & \sigma_k^{-1}(j, k+1)^\varepsilon(ik)^\delta \\ \equiv & \{\{(i, k+1)^\delta, (j, k+1)^{-1}(k, k+1)^{-1}(j, k+1)(k, k+1)\}, \\ & \{(k, k+1), (j, k+1)(k, k+1)\}\}(jk)^\varepsilon\sigma_k^{-1} \\ \equiv & (k, k+1)^{-1}(i, k+1)^\delta(k, k+1)(jk)^\varepsilon\sigma_k^{-1}. \end{aligned}$$

If $\varepsilon = -1$, then

$$\begin{aligned}
& \sigma_k^{-1}(j, k+1)^\varepsilon (ik)^\delta \\
\equiv & \{ \{ (i, k+1)^\delta, (k, k+1)(j, k+1)(k, k+1)^{-1}(j, k+1)^{-1} \}, \{ (k, k+1), (j, k+1)^{-1} \} \} \\
& (jk)^\varepsilon \sigma_k^{-1} \\
\equiv & (k, k+1)^{-1}(i, k+1)^\delta (k, k+1)(jk)^\varepsilon \sigma_k^{-1}.
\end{aligned}$$

On the other hand,

$$\{ (i, k+1)^\delta, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1}(j, k+1)^\varepsilon \equiv (k, k+1)^{-1}(i, k+1)^\delta (k, k+1)(jk)^\varepsilon \sigma_k^{-1}.$$

2) $k < l-1, j < i < k < k+1 < l$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w & \equiv (jl)^\varepsilon \{ (i, k+1)^\delta, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1} - \\
& (k, k+1)^{-1}(i, k+1)^\delta (k, k+1)(jl)^\varepsilon \sigma_k^{-1} \\
& \equiv (jl)^\varepsilon (k, k+1)^{-1}(i, k+1)^\delta (k, k+1) \sigma_k^{-1} - \\
& (jl)^\varepsilon (k, k+1)^{-1}(i, k+1)^\delta (k, k+1) \sigma_k^{-1} \\
& \equiv 0.
\end{aligned}$$

(6) $\wedge$ (13)

Let $f = \sigma_k^{-1}(ik)^\delta - \{ (i, k+1)^\delta, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1}$, $g = (ik)^\delta (jl)^\varepsilon - (jl)^\varepsilon (ik)^\delta, i < k < j < l$.
Then $w = \sigma_k^{-1}(ik)^\delta (jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = \sigma_k^{-1}(jl)^\varepsilon (ik)^\delta - \{ (i, k+1)^\delta, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1}(jl)^\varepsilon.$$

There are two cases to consider.

1) $k = j-1, i < k < k+1 = j < l$.

$$\begin{aligned}
& \sigma_k^{-1}(k+1, l)^\varepsilon (ik)^\delta \\
\equiv & (kl)^\varepsilon \{ (i, k+1)^\delta, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1} \\
\equiv & (kl)^\varepsilon (k, k+1)^{-1}(i, k+1)^\delta (k, k+1) \sigma_k^{-1} \quad \text{and} \\
& \{ (i, k+1)^\delta, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1}(k+1, l)^\varepsilon \\
\equiv & (k, k+1)^{-1}(i, k+1)^\delta (k, k+1)(kl)^\varepsilon \sigma_k^{-1} \\
\equiv & (k, k+1)^{-1}(i, k+1)^\delta \{ (kl)^\varepsilon, (k+1, l) \} (k, k+1) \sigma_k^{-1}.
\end{aligned}$$

If $\varepsilon = 1$, then

$$\begin{aligned}
& \{ (i, k+1)^\delta, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1}(k+1, l)^\varepsilon \\
\equiv & (k, k+1)^{-1} \{ \{ (kl)^\varepsilon, (il)^{-1}(k+1, l)^{-1}(il)(k+1, l) \}, \{ (k+1, l), (il)(k+1, l) \} \} \\
& (i, k+1)^\delta (k, k+1) \sigma_k^{-1} \\
\equiv & (k, k+1)^{-1} \{ (kl)^\varepsilon, (k+1, l) \} (i, k+1)^\delta (k, k+1) \sigma_k^{-1} \\
\equiv & \{ \{ (kl)^\varepsilon, (k+1, l)^{-1}(kl)^{-1} \}, \{ (k+1, l), (kl)^{-1} \} \} (k, k+1)^{-1}(i, k+1)^\delta (k, k+1) \sigma_k^{-1} \\
\equiv & (kl)^\varepsilon (k, k+1)^{-1}(i, k+1)^\delta (k, k+1) \sigma_k^{-1}.
\end{aligned}$$

If $\varepsilon = -1$, then

$$\begin{aligned}
& \{(i, k+1)^\delta, (k, k+1)\} \sigma_k^{-1} (k+1, l)^\varepsilon \\
& \equiv (k, k+1)^{-1} \{ \{ (kl)^\varepsilon, (k+1, l)(il)(k+1, l)^{-1}(il)^{-1} \}, \{ (k+1, l), (il)^{-1} \} \} \\
& \quad (i, k+1)^\delta (k, k+1) \sigma_k^{-1} \\
& \equiv (k, k+1)^{-1} \{ (kl)^\varepsilon, (k+1, l) \} (i, k+1)^\delta (k, k+1) \sigma_k^{-1} \\
& \equiv (kl)^\varepsilon (k, k+1)^{-1} (i, k+1)^\delta (k, k+1) \sigma_k^{-1}.
\end{aligned}$$

2) $k < j-1, i < k < k+1 < j < l$.

$$(f, g)_w \equiv (jl)^\varepsilon \{ (i, k+1)^\delta, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1} - (jl)^\varepsilon \{ (i, k+1)^\delta, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1} \equiv 0.$$

(7) $\wedge$ (7)

Let $f = (ij)^{-1}(jk)^{-1} - \{ (jk)^{-1}, (ik)^{-1} \} (ij)^{-1}$, $g = (jk)^{-1}(kl)^\varepsilon - \{ (kl)^\varepsilon, (jl)^{-1} \} (jk)^{-1}$, $i < j < k < l$. Then $w = (ij)^{-1}(jk)^{-1}(kl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (ij)^{-1} \{ (kl)^\varepsilon, (jl)^{-1} \} (jk)^{-1} - \{ (jk)^{-1}, (ik)^{-1} \} (ij)^{-1} (kl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (ij)^{-1} \{ (kl)^\varepsilon, (jl)^{-1} \} (jk)^{-1} \\
& \equiv \{ (kl)^\varepsilon, \{ (jl)^{-1}, (il)^{-1} \} \} \{ (jk)^{-1}, (ik)^{-1} \} (ij)^{-1} \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \{ (jk)^{-1}, (ik)^{-1} \} (ij)^{-1} (kl)^\varepsilon \\
& \equiv (ik)(jk)^{-1}(ik)^{-1}(ij)^{-1}(kl)^\varepsilon \\
& \equiv (ik)(jk)^{-1} \{ (kl)^\varepsilon, (il)^{-1} \} (ik)^{-1} (ij)^{-1} \\
& \equiv (ik) \{ \{ (kl)^\varepsilon, (jl)^{-1} \}, (il)^{-1} \} (jk)^{-1} (ik)^{-1} (ij)^{-1} \\
& \equiv \{ \{ \{ (kl)^\varepsilon, (il)(kl) \}, \{ (jl)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \} \}, \{ (il)^{-1}(kl) \} \} \\
& \quad (ik)(jk)^{-1}(ik)^{-1}(ij)^{-1} \\
& \equiv \{ (kl)^\varepsilon, \{ (jl)^{-1}, (il)^{-1} \} \} \{ (jk)^{-1}, (ik)^{-1} \} (ij)^{-1}.
\end{aligned}$$

(7) $\wedge$ (8)

Let $f = (ij)^{-1}(jk) - \{ (jk), (ik)^{-1} \} (ij)^{-1}$, $g = (jk)(kl)^\varepsilon - \{ (kl)^\varepsilon, (jl)(kl) \} (jk)$, $i < j < k < l$. Then $w = (ij)^{-1}(jk)(kl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (ij)^{-1} \{ (kl)^\varepsilon, (jl)(kl) \} (jk) - \{ (jk), (ik)^{-1} \} (ij)^{-1} (kl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (ij)^{-1} \{ (kl)^\varepsilon, (jl)(kl) \} (jk) \\
& \equiv \{ (kl)^\varepsilon, \{ (jl), (il)^{-1} \} (kl) \} \{ (jk), (ik)^{-1} \} (ij)^{-1} \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \{ (jk), (ik)^{-1} \} (ij)^{-1} (kl)^\varepsilon \\
& \equiv (ik)(jk) \{ (kl)^\varepsilon, (il)^{-1} \} (ik)^{-1} (ij)^{-1} \\
& \equiv (ik) \{ \{ (kl)^\varepsilon, (jl)(kl) \}, (il)^{-1} \} (jk)(ik)^{-1} (ij)^{-1} \\
& \equiv \{ \{ \{ (kl)^\varepsilon, (il)(kl) \}, \{ (jl), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \} \}, \{ (kl), (il)(kl) \} \} \\
& \quad \{ (kl), (il)(kl) \} \}, \{ (il)^{-1}, (kl)^{-1}(il)^{-1} \} \} (ik)(jk)(ik)^{-1} (ij)^{-1} \\
& \equiv \{ (kl)^\varepsilon, \{ (jl), (il)^{-1} \} (kl) \} \{ (jk), (ik)^{-1} \} (ij)^{-1}.
\end{aligned}$$

(7) $\wedge$ (9)

Let $f = (ij)^{-1}(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (ik)^{-1}\}(ij)^{-1}$, $g = (jk)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1}$, $i < j < k < l$. Then $w = (ij)^{-1}(jk)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (ij)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (ik)^{-1}\}(ij)^{-1}(jl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned} & (ij)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1} \\ \equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}\{(jl)^{-1}, (il)^{-1}\}\}\{(jk)^{-1}, (ik)^{-1}\}(ij)^{-1} \quad \text{and} \\ & \{(jk)^{-1}, (ik)^{-1}\}(ij)^{-1}(jl)^\varepsilon \\ \equiv & (ik)(jk)(ik)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}\}(ij)^{-1} \\ \equiv & (ik)(jk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(il)^{-1}, (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(ij)^{-1} \\ \equiv & (ik)(jk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}\}(ik)^{-1}(ij)^{-1} \\ \equiv & (ik)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, (il)^{-1}\}(jk)^{-1}(ik)^{-1}(ij)^{-1} \\ \equiv & \{\{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}\} \\ & \{(jl)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}\}, \{(il)^{-1}(kl)\}\}(ik)(jk)^{-1}(ik)^{-1}(ij)^{-1} \\ \equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}\{(jl)^{-1}, (il)^{-1}\}\}\{(jk)^{-1}, (ik)^{-1}\}(ij)^{-1}. \end{aligned}$$

(7) $\wedge$ (10)

Let $f = (ij)^{-1}(jk) - \{(jk), (ik)^{-1}\}(ij)^{-1}$, $g = (jk)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk)$, $i < j < k < l$. Then $w = (ij)^{-1}(jk)(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (ij)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk) - \{(jk), (ik)^{-1}\}(ij)^{-1}(jl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned} & (ij)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk) \\ \equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}\}, (kl)\}\{(jk), (ik)^{-1}\}(ij)^{-1} \quad \text{and} \\ & \{(jk), (ik)^{-1}\}(ij)^{-1}(jl)^\varepsilon \\ \equiv & (ik)(jk)\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}\}(ik)^{-1}(ij)^{-1} \\ \equiv & (ik)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, (il)^{-1}\}(jk)(ik)^{-1}(ij)^{-1} \\ \equiv & \{\{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}\}, \{(il)^{-1}(kl)\}\} \\ & (ik)(jk)(ik)^{-1}(ij)^{-1} \\ \equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}\}, (kl)\}\{(jk), (ik)^{-1}\}(ij)^{-1}. \end{aligned}$$

(7) $\wedge$ (11)

Let $f = (pi)^{-1}(ik)^{-1} - \{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}\}(pi)^{-1}$, $g = (ik)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}$, $p < i < j < k < l$. Then $w = (pi)^{-1}(ik)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pi)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} - \{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}\}(pi)^{-1}(jl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (pi)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (kl)\{(il), (pl)^{-1}\}(kl)^{-1}\{(il)^{-1}, (pl)^{-1}\}\}\{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}\}(pi)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}\}(pi)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(jl)^\varepsilon(pi)^{-1} \\
\equiv & (pk)(ik)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}(pk)^{-1}(pi)^{-1} \\
\equiv & (pk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(kl)(il)^{-1}\}(pl) \\
& \{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}(pl)^{-1}\}(ik)^{-1}(pk)^{-1}(pi)^{-1} \\
\equiv & (pk)\{(jl)^\varepsilon, (kl)\{(kl)^{-1}(il)^{-1}(pl)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(pk)^{-1}(pi)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\} \\
& \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}, \{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(pl)^{-1}, (kl)\}\}(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(pi)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (kl)\{(il), (pl)^{-1}\}(kl)^{-1}\{(il)^{-1}, (pl)^{-1}\}\}\{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}\}(pi)^{-1}.
\end{aligned}$$

(7) $\wedge$ (12)

Let $f = (pi)^{-1}(ik) - \{(ik), (pk)^{-1}\}(pi)^{-1}$, $g = (ik)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik)$, $p < i < j < k < l$. Then $w = (pi)^{-1}(ik)(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pi)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) - \{(ik), (pk)^{-1}\}(pi)^{-1}(jl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (pi)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, \{(il)^{-1}, (pl)^{-1}\}(kl)^{-1}\{(il), (pl)^{-1}\}(kl)\}\{(ik), (pk)^{-1}\}(pi)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(ik), (pk)^{-1}\}(pi)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (pk)(ik)\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}(pk)^{-1}(pi)^{-1} \\
\equiv & (pk)\{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}(pl) \\
& \{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}(pl)^{-1}\}(ik)(pk)^{-1}(pi)^{-1} \\
\equiv & (pk)\{(jl)^\varepsilon, (kl)\{(kl)^{-1}, (il)(kl)(pl)^{-1}\}\}(ik)(pk)^{-1}(pi)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\}\{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}, \\
& \{(il), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(kl), (pl)(kl)\}\{(pl)^{-1}, (kl)\}\}\}(pk)(ik)(pk)^{-1}(pi)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, \{(il)^{-1}, (pl)^{-1}\}(kl)^{-1}\{(il), (pl)^{-1}\}(kl)\}\{(ik), (pk)^{-1}\}(pi)^{-1}.
\end{aligned}$$

(7) $\wedge$ (13)

$f = (pi)^{-1}(ik)^\delta - \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}\}(pi)^{-1}$, $g = (ik)^\delta(jl)^\varepsilon - (jl)^\varepsilon(ik)^\delta$. Then $w = (pi)^{-1}(ik)^\delta(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pi)^{-1}(jl)^\varepsilon(ik)^\delta - \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}\}(pi)^{-1}(jl)^\varepsilon.$$

There are two cases to consider.

1) $p < i < k, j < i < k < l$. In this case, there are three subcases to consider.

a) $p < j, p < j < i < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (pi)^{-1}(jl)^\varepsilon(ik)^\delta \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)(pl)(il)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ik)^\delta, (pk)^{-1}\}(pi)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}\}(pi)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (pk)(ik)^\delta(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)(pl)(il)^{-1}(pl)^{-1}\}(pi)^{-1} \\
\equiv & (pk)(ik)^\delta\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(il), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& \{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(il)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(pl)^{-1}, (kl)^{-1} \\
& (pl)^{-1}\}(pk)^{-1}(pi)^{-1} \\
\equiv & (pk)(ik)^\delta\{(jl)^\varepsilon, (il)(kl)(pl)(kl)^{-1}(il)^{-1}(pl)^{-1}\}(pk)^{-1}(pi)^{-1}.
\end{aligned}$$

If $\delta = 1$, then

$$\begin{aligned}
& \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}\}(pi)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (pk)\{(jl)^\varepsilon, \{(il), (kl)\}\{(kl), (il)(kl)\}(pl)\{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}\} \\
& (il)^{-1}, (kl)\}(pl)^{-1}\}(ik)^\delta(pk)^{-1}(pi)^{-1} \\
\equiv & (pk)\{(jl)^\varepsilon, (il)(kl)(pl)(kl)^{-1}(il)^{-1}(pl)^{-1}\}(ik)^\delta(pk)^{-1}(pi)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{\{(pl), (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\} \\
& \{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\}\{(pl), (kl)\}\}\{(ik)^\delta, (pk)^{-1}\}(pi)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)(pl)(il)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ik)^\delta, (pk)^{-1}\}(pi)^{-1}.
\end{aligned}$$

If $\delta = -1$, then

$$\begin{aligned}
& \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}\}(pi)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (pk)\{(jl)^\varepsilon, \{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}(pl)\{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\} \\
& \{(il)^{-1}, (kl)^{-1}(il)^{-1}\}(pl)^{-1}\}(ik)^\delta(pk)^{-1}(pi)^{-1} \\
\equiv & (pk)\{(jl)^\varepsilon, (il)(kl)(pl)(kl)^{-1}(il)^{-1}(pl)^{-1}\}(ik)^\delta(pk)^{-1}(pi)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)(pl)(il)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ik)^\delta, (pk)^{-1}\}(pi)^{-1}.
\end{aligned}$$

b) $p = j, p = j < i < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (pi)^{-1}(jl)^\varepsilon(ik)^\delta \\
= & (ji)^{-1}(jl)^\varepsilon(ik)^\delta \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(ik)^\delta, (jk)^{-1}\}(ji)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}\}(pi)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (jk)(ik)^\delta(jk)^{-1}(ji)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (jk)(ik)^\delta(jk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(jl)^{-1}\}(ji)^{-1} \\
\equiv & (jk)(ik)^\delta\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, \{(il)^{-1}, (kl)(jl)(kl)^{-1}(jl)^{-1}\} \\
& \{(jl)^{-1}, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1}(jl)^{-1} \\
\equiv & (jk)(ik)^\delta\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(il)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1}(ji)^{-1}.
\end{aligned}$$

If $\delta = 1$, then

$$\begin{aligned}
& \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}\}(pi)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (jk)\{(jl)^\varepsilon, \{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}\{(il)^{-1}, (kl)\}(jl)^{-1}\}(ik)^\delta(jk)^{-1}(ji)^{-1} \\
\equiv & (jk)\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(il)^{-1}(jl)^{-1}\}(ik)^\delta(jk)^{-1}(ji)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}\{(kl)^{-1}, (jl)(kl)\}\{(il)^{-1}, (jl)^{-1}(kl)^{-1}(ji)(kl)\} \\
& \{(jl)^{-1}, (kl)\}\}(jk)(ik)^\delta(jk)^{-1}(ji)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(ik)^\delta, (jk)^{-1}\}(ji)^{-1}.
\end{aligned}$$

If $\delta = -1$, then

$$\begin{aligned}
& \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}\}(pi)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (jk)\{(jl)^\varepsilon, \{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}\{(il)^{-1}, (kl)^{-1}(il)^{-1}\}(jl)^{-1}\}(ik)^\delta(jk)^{-1}(ji)^{-1} \\
\equiv & (jk)\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(il)^{-1}(jl)^{-1}\}(ik)^\delta(jk)^{-1}(ji)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(ik)^\delta, (jk)^{-1}\}(ji)^{-1}.
\end{aligned}$$

c) $p > j, j < p < i < k < l$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w & \equiv (jl)^\varepsilon \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}\}(pi)^{-1} - (pk)(ik)^\delta(pk)^{-1}(pi)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
& \equiv (jl)^\varepsilon (pk)(ik)^\delta(pk)^{-1}(pi)^{-1} - (jl)^\varepsilon (pk)(ik)^\delta(pk)^{-1}(pi)^{-1} \\
& \equiv 0.
\end{aligned}$$

2) $p < i < k < j < l$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w & = (pi)^{-1}(jl)^\varepsilon(ik)^\delta - \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}\}(pi)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
& \equiv (jl)^\varepsilon(pi)^{-1}(ik)^\delta - (jl)^\varepsilon \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}\}(pi)^{-1} \\
& \equiv 0.
\end{aligned}$$

(8) $\wedge$ (7)

Let $f = (ij)(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (ik)(jk)\}(ij)$, $g = (jk)^{-1}(kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1}$, $i < j < k < l$. Then $w = (ij)(jk)^{-1}(kl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (ij)\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (ik)(jk)\}(ij)(kl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (ij)\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1} \\
\equiv & \{(kl)^\varepsilon, \{(jl)^{-1}, (il)(jl)\}\}\{(jk)^{-1}, (ik)(jk)\}(ij) \quad \text{and} \\
& \{(jk)^{-1}, (ik)(jk)\}(ij)(kl)^\varepsilon \\
\equiv & (jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)(jk)(kl)^\varepsilon(ij) \\
\equiv & (jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk)(ij) \\
\equiv & (jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)^{-1}\{\{(kl)^\varepsilon, (il)(kl)\}, \{(jl), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\} \\
& \{(kl), (il)(kl)\}\}(ik)(jk)(ij) \\
\equiv & (jk)^{-1}(ik)^{-1}\{\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}, (il)\{(jl), (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(kl), (jl)^{-1}\}\} \\
& (jk)^{-1}(ik)(jk)(ij) \\
\equiv & (jk)^{-1}\{\{\{(kl)^\varepsilon, (il)^{-1}\}, \{(jl)^{-1}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}\}, \\
& \{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(jl), (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)(jk)(ij) \\
\equiv & \{\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}, (il)^{-1}\{(kl)^{-1}, (jl)^{-1}\}\{(jl)^{-1}, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(kl), (jl)^{-1}\}(il) \\
& \{(kl)^{-1}, (jl)^{-1}\}\{(jl), (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(kl), (jl)^{-1}\}\}(jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)(jk)(ij) \\
\equiv & \{(kl)^\varepsilon, \{(jl)^{-1}, (il)(jl)\}\}\{(jk)^{-1}, (ik)(jk)\}(ij).
\end{aligned}$$

(8) $\wedge$ (8)

Let $f = (ij)(jk) - \{(jk), (ik)(jk)\}(ij)$, $g = (jk)(kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk)$, $i < j < k < l$. Then $w = (ij)(jk)(kl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (ij)\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk) - \{(jk), (ik)(jk)\}(ij)(kl) \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (ij)\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk) \\
\equiv & \{(kl)^\varepsilon, \{(jl), (il)(jl)\}(kl)\}\{jk, (ik)(jk)\}(ij) \quad \text{and} \\
& \{(jk), (ik)(jk)\}(ij)(kl) \\
\equiv & (jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)(ik)(jk)(kl)(ij) \\
\equiv & (jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)(ik)\{(kl), (jl)(kl)\}(jk)(ij) \\
\equiv & (jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)\{\{(kl), (il)(kl)\}, \{(jl), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}\{(kl), (il)(kl)\}\}(ik)(jk)(ij) \\
\equiv & (jk)^{-1}(ik)^{-1}\{\{(kl), (jl)(kl)\}, (il)\{(jl), (kl)\}\{(kl), (jl)(kl)\}\}(jk)(ik)(jk)(ij) \\
\equiv & (jk)^{-1}\{\{(kl), (il)^{-1}\}, \{(jl), (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}\{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\} \\
& \{(jl), (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(jk)(ik)(jk)(ij) \\
\equiv & \{\{(kl), (jl)^{-1}\}, \{\{(jl), (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, \{(kl), (jl)^{-1}\}(il)\}\{(jl), (kl)^{-1}(jl)^{-1}\} \\
& \{(kl), (jl)^{-1}\}\}\{(jk), (ik)(jk)\}(ij) \\
\equiv & \{(kl)^\varepsilon, \{(jl), (il)(jl)\}(kl)\}\{jk, (ik)(jk)\}(ij).
\end{aligned}$$

(8) $\wedge$ (9)

Let $f = (ij)(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (ik)(jk)\}(ij)$, $g = (jk)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1}$, $i < j < k < l$. Then $w = (ij)(jk)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (ij)\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (ik)(jk)\}(ij)(jl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (ij)\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)(jl)(kl)^{-1}\{(jl)^{-1}, (il)(jl)\}\}\{(jk)^{-1}, (ik)(jk)\}(ij) \quad \text{and} \\
& \{(jk)^{-1}, (ik)(jk)\}(ij)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)(jk)\{(jl)^\varepsilon, (il)(jl)\}(ij) \\
\equiv & (jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, (il)\{(jl), (kl)\}\}(jk)(ij) \\
\equiv & (jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}\}, \{(il), (kl)\} \\
& \{\{(jl), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}\}\}(ik)(jk)(ij) \\
\equiv & (jk)^{-1}(ik)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, (il)\{(jl), (kl)^{-1}(jl)^{-1}\} \\
& \{(kl), (jl)^{-1}\}\}(jk)^{-1}(ik)(jk)(ij) \\
\equiv & (jk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\} \\
& \{(jl)^{-1}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}\}, \{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\} \\
& \{(jl)^{-1}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)(jk)(ij) \\
\equiv & (jk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}(kl)^{-1}(jl)^{-1}(kl)(il)(kl)^{-1}(jl)(kl)\} \\
& (ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)(jk)(ij) \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, \{(kl), (jl)^{-1}\}(il)\{(kl)^{-1}, (jl)^{-1}\} \\
& (il)^{-1}\{(kl)^{-1}, (jl)^{-1}\}\{(jl)^{-1}, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(kl), (jl)^{-1}\}(il)\{(kl)^{-1}, (jl)^{-1}\} \\
& \{(jl), (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(kl), (jl)^{-1}\}\}(jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)(jk)(ij) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)(jl)(kl)^{-1}\{(jl)^{-1}, (il)(jl)\}\}\{(jk)^{-1}, (ik)(jk)\}(ij).
\end{aligned}$$

(8) $\wedge$ (10)

Let $f = (ij)(jk) - \{(jk), (ik)(jk)\}(ij)$, $g = (jk)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk)$, $i < j < k < l$
Then $w = (ij)(jk)(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (ij)\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk) - \{(jk), (ik)(jk)\}(ij)(jl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (ij)\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk) \equiv \{(jl)^\varepsilon, (il)(jl)(kl)\}\{(jk), (ik)(jk)\}(ij) \quad \text{and} \\
& \{(jk), (ik)(jk)\}(ij)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)\{(jl)^\varepsilon, (il)(jl)(kl)\}(ik)(jk)(ij) \\
\equiv & (jk)^{-1}(ik)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(il)\{(jl), (kl)\}\{(kl), (jl)(kl)\}\}(jk)(ik)(jk)(ij) \\
\equiv & (jk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(kl), (il)^{-1}\}\}, \{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\} \\
& \{(jl), (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl)(il)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(jk)(ik)(jk)(ij) \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, \{(kl), (jl)^{-1}\}(il)\{(jl), (kl)^{-1}(jl)^{-1}\} \\
& \{(kl), (jl)^{-1}\}\}\{(jk), (ik)(jk)\}(ij) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)(jl)(kl)\}\{(jk), (ik)(jk)\}(ij).
\end{aligned}$$

(8) $\wedge$ (11)

Let $f = (pi)(ik)^{-1} - \{(ik)^{-1}, (pk)(ik)\}(pi)$, $g = (ik)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}$, $p <$

$i < j < k < l$. Then $w = (pi)(ik)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pi)\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} - \{(ik)^{-1}, (pk)(ik)\}(pi)(jl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned} & (pi)\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} \\ \equiv & \{(jl)^\varepsilon, (kl)\{(il), (pl)(il)\}(kl)^{-1}\{(il)^{-1}, (pl)(il)\}\}\{(ik)^{-1}, (pk)(ik)\}(pi) \quad \text{and} \\ & \{(ik)^{-1}, (pk)(ik)\}(pi)(jl)^\varepsilon \\ \equiv & (ik)^{-1}(pk)^{-1}(ik)^{-1}(pk)\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik)(pi) \\ \equiv & (ik)^{-1}(pk)^{-1}(ik)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(il)^{-1}, (pl)^{-1} \\ & (kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\{(il), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(kl), (pl)(kl)\}\}(pk)(ik)(pi) \\ \equiv & (ik)^{-1}(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(il)^{-1}, (kl)^{-1}(il)^{-1}\} \\ & (pl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}(pl)\{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}(ik)^{-1}(pk)(ik)(pi) \\ \equiv & (ik)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \\ & \{(il), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(il), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\ & \{(kl), (pl)^{-1}\}\}(pk)^{-1}(ik)^{-1}(pk)(ik)(pi) \\ \equiv & \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(il)^{-1}, (kl)^{-1}(il)^{-1}\} \\ & \{(kl), (il)^{-1}\}(pl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}\{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}(pl) \\ & \{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}(pl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}\{(il)^{-1}, (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\} \\ & (pl)\{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}\{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}\{(ik)^{-1}(pk)(ik)\}(pi) \\ \equiv & \{(jl)^\varepsilon, (kl)\{(il), (pl)(il)\}(kl)^{-1}\{(il)^{-1}, (pl)(il)\}\}\{(ik)^{-1}, (pk)(ik)\}(pi). \end{aligned}$$

(8) $\wedge$ (12)

Let n $f = (pi)(ik) - \{(ik), (pk)(ik)\}(pi)$, $g = (ik)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik)$, $p < i < j < k < l$. Then $w = (pi)(ik)(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pi)\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) - \{(ik), (pk)(ik)\}(pi)(jl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (pi)\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, \{(il)^{-1}, (pl)(il)\}(kl)^{-1}\{(il), (pl)(il)\}(kl)\}\{(ik), (pk)(ik)\}(pi) \quad \text{and} \\
& \{(ik), (pk)(jk)\}(pi)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (ik)^{-1}(pk)^{-1}(ik)\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(il)(kl)\}(pk)(ik)(pi) \\
\equiv & (ik)^{-1}(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(il)^{-1}, (kl)\}(pl)^{-1} \\
& \{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}(pl)\{(il), (kl)\}\{(kl), (il)(kl)\}\}(ik)(pk)(ik)(pi) \\
\equiv & (ik)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(il)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& \{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\}\{(il)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\} \\
& \{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\}\{(il), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& \{(il), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\}(pk)^{-1}(ik)(pk)(ik)(pi) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(il)^{-1}, (kl)^{-1}(il)^{-1}\} \\
& \{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}, \{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(kl), (il)^{-1}\}(pl)\}\} \\
& \{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(pk)^{-1}(ik)(pk)(ik)(pi) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, \{(il)^{-1}, (pl)(il)\}(kl)^{-1}\{(il), (pl)(il)\}(kl)\}\{(ik), (pk)(ik)\}(pi).
\end{aligned}$$

(8) $\wedge$ (13)

Let $f = (pi)(ik)^\delta - \{(ik)^\delta, (pk)(ik)\}(pi)$, $g = (ik)^\delta(jl)^\varepsilon - (jl)^\varepsilon(ik)^\delta$. Then $w = (pi)(ik)^\delta(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pi)(jl)^\varepsilon(ik)^\delta - \{(ik)^\delta, (pk)(ik)\}(pi)(jl)^\varepsilon.$$

There are two cases to consider.

1) $p < i < k, j < i < k < l$. In this case, there are three subcases to consider.

(a) $p < j, p < j < i < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (pi)(jl)^\varepsilon(ik)^\delta \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(il)^{-1}(pl)(il)\}\{(ik)^\delta, (pk)(ik)\}(pi) \quad \text{and} \\
& \{(ik)^\delta, (pk)(ik)\}(pi)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (ik)^{-1}(pk)^{-1}(ik)^\delta(pk)(ik)\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(il)^{-1}(pl)(il)\}(pi) \\
\equiv & (ik)^{-1}(pk)^{-1}(ik)^\delta(pk)\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(il)^{-1}, (kl)\}(pl)\{(il), (kl)\}\}(ik)(pi) \\
\equiv & (ik)^{-1}(pk)^{-1}(ik)^\delta\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}\} \\
& \{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\}\} \\
& \{(pl), (kl)\}\{(il), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\}\}(pk)(ik)(pi) \\
\equiv & (ik)^{-1}(pk)^{-1}(ik)^\delta\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(il)^{-1}(pl)(il)(kl)\}(pk)(ik)(pi).
\end{aligned}$$

If $\delta = 1$, then

$$\begin{aligned}
& \{(ik)^\delta, (pk)(ik)\}(pi)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (ik)^{-1}(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}\{(il)^{-1}, (kl)\}(pl) \\
& \{(il), (kl)\}\{(kl), (il)(kl)\}\}(ik)^\delta(pk)(ik)(pi) \\
\equiv & (ik)^{-1}(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(pl), (il)(kl)\}\}(ik)^\delta(pk)(ik)(pi) \\
\equiv & (ik)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& \{\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(il), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\}\} \\
& (pk)^{-1}(ik)^\delta(pk)(ik)(pi) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(pl), \{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}\{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\} \\
& \{(kl), (il)^{-1}\}\}\}(ik)^{-1}(pk)^{-1}(ik)^\delta(pk)(ik)(pi) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(il)^{-1}(pl)(il)\}\{(ik)^\delta, (pk)(ik)\}(pi).
\end{aligned}$$

If $\delta = -1$, then

$$\begin{aligned}
& \{(ik)^\delta, (pk)(ik)\}(pi)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (ik)^{-1}(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}\{(il)^{-1}, (kl)^{-1} \\
& (il)^{-1}\}(pl)\{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}(ik)^\delta(pk)(ik)(pi) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(il)^{-1}(pl)(il)\}\{(ik)^\delta, (pk)(ik)\}(pi).
\end{aligned}$$

(b) $p = j, p < j < i < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (pi)(jl)^\varepsilon(ik)^\delta \\
\equiv & (ji)(jl)^\varepsilon(ik)^\delta \equiv \{(jl)^\varepsilon, (il)\}\{(ik)^\delta, (jk)(ik)\}(ji) \quad \text{and} \\
& \{(ik)^\delta, (pk)(ik)\}(pi)(jl)^\varepsilon = (ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)^\delta(jk)(ik)(ji)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)^\delta(jk)(ik)\{(jl)^\varepsilon, (il)\}(ji) \\
\equiv & (ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)^\delta(jk)\{(jl)^\varepsilon, \{(il), (kl)\}\}(ik)(ji) \\
\equiv & (ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)^\delta\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}\{\{(il), (jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(kl)\}, \\
& \{(kl), (jl)(kl)\}\}\}(jk)(ik)(ji) \\
\equiv & (ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)^\delta\{(jl)^\varepsilon, (il)(kl)\}(jk)(ik)(ji).
\end{aligned}$$

If $\delta = 1$, then

$$\begin{aligned}
& \{(ik)^\delta, (pk)(ik)\}(pi)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (ik)^{-1}(jk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, \{(il), (kl)\}\{(kl), (il)(kl)\}\}(ik)^\delta(jk)(ik)(ji) \\
\equiv & (ik)^{-1}(jk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)(kl)\}(ik)^\delta(jk)(ik)(ji) \\
\equiv & (ik)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, \{(il), (kl)(jl)(kl)^{-1}(jl)^{-1}\} \\
& \{(kl), (jl)^{-1}\}\}(jk)^{-1}(ik)^\delta(jk)(ik)(ji) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}\{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\} \\
& \{(kl), (il)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)^\delta(jk)(ik)(ji) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)\}\{(ik)^\delta, (jk)(ik)\}(ji).
\end{aligned}$$

If $\delta = -1$, then

$$\begin{aligned}
& \{(ik)^\delta, (pk)(ik)\}(pi)(jl)^\varepsilon \\
& \equiv (ik)^{-1}(jk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, \{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}\}(ik)^\delta(jk)(ik)(ji) \\
& \equiv (ik)^{-1}(jk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)(kl)\}(ik)^\delta(jk)(ik)(ji) \\
& \equiv \{(jl)^\varepsilon, (il)\}\{(ik)^\delta, (jk)(ik)\}(ji).
\end{aligned}$$

(c) $p > j, j < p < i < k < l$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w & \equiv (jl)^\varepsilon(pi)(ik)^\delta - (jl)^\varepsilon\{(ik)^\delta, (pk)(ik)\}(pi) \\
& \equiv 0.
\end{aligned}$$

2) $p < i < k < j < l$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w & = (pi)(jl)^\varepsilon(ik)^\delta - \{(ik)^\delta, (pk)(ik)\}(pi)(jl)^\varepsilon \\
& \equiv (jl)^\varepsilon(pi)(ik)^\delta - (jl)^\varepsilon\{(ik)^\delta, (pk)(ik)\}(pi) \\
& \equiv 0.
\end{aligned}$$

(9) $\wedge$ (7)

Let $f = (ji)^{-1}(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (ik)^{-1}(jk)^{-1}\}(ji)^{-1}$, $g = (jk)^{-1}(kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1}$, $j < i < k < l$. Then $w = (ji)^{-1}(jk)^{-1}(kl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (ji)^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (ik)^{-1}(jk)^{-1}\}(ji)^{-1}(kl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (ji)^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1} \\
& \equiv \{(kl)^\varepsilon, \{(jl)^{-1}, (il)^{-1}(jl)^{-1}\}\}\{(jk)^{-1}, (ik)^{-1}(jk)^{-1}\}(ji)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(jk)^{-1}, (ik)^{-1}(jk)^{-1}\}(ji)^{-1}(kl)^\varepsilon \\
& \equiv (jk)(ik)(jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)^{-1}(kl)^\varepsilon(ji)^{-1} \\
& \equiv (jk)(ik)(jk)^{-1}(ik)^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1}(ji)^{-1} \\
& \equiv (jk)(ik)(jk)^{-1}\{\{(kl)^\varepsilon, (il)^{-1}\}, (jl)^{-1}\}(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ji)^{-1} \\
& \equiv (jk)(ik)\{\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}, \{(il)^{-1}, (kl)(jl)(kl)^{-1}(jl)^{-1}\} \\
& \quad \{(jl)^{-1}, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\}(jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ji)^{-1} \\
& \equiv (jk)\{\{(kl)^\varepsilon, (il)(kl)\}, (jl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}\{(il)^{-1}, (kl)\}(jl)^{-1}\} \\
& \quad (ik)(jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ji)^{-1} \\
& \equiv \{\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}, \{(il), (jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(kl)\}\{(kl), (jl)(kl)\}\{(jl)^{-1}, (kl)\}\{(kl)^{-1}, \\
& \quad (jl)(kl)\}\{(il)^{-1}, (jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(kl)\}\{(jl)^{-1}, (kl)\}\}(jk)(ik)(jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ji)^{-1} \\
& \equiv \{(kl)^\varepsilon, \{(jl)^{-1}, (il)^{-1}(jl)^{-1}\}\}\{(jk)^{-1}, (ik)^{-1}(jk)^{-1}\}(ji)^{-1}.
\end{aligned}$$

(9) $\wedge$ (8)

let $f = (ji)^{-1}(jk) - \{(jk), (ik)^{-1}(jk)^{-1}\}(ji)^{-1}$, $g = (jk)(kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk)$, $j < i < k < l$. Then $w = (ji)^{-1}(jk)(kl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (ji)^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk) - \{(jk), (ik)^{-1}(jk)^{-1}\}(ji)^{-1}(kl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (ji)^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk) \\
\equiv & \{(kl)^\varepsilon, \{(jl), (il)^{-1}(jl)^{-1}\}(kl)\}\{(jk), (ik)^{-1}(jk)^{-1}\}(ji)^{-1} \\
\equiv & \{(kl)^\varepsilon, (jl)(il)(jl)(il)^{-1}(jl)^{-1}(kl)\}(jk)(ik)(jk)(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ji)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(jk), (ik)^{-1}(jk)^{-1}\}(ji)^{-1}(kl)^\varepsilon \\
\equiv & (jk)(ik)(jk)\{(kl)^\varepsilon, (il)^{-1}(jl)^{-1}\}(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ji)^{-1} \\
\equiv & (jk)(ik)\{\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}, \{(il)^{-1}, (jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(kl)\} \\
& \{(jl)^{-1}, (kl)\}\}(jk)(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ji)^{-1} \\
\equiv & (jk)\{\{(kl)^\varepsilon, (il)(kl)\}, (jl)\{(il)^{-1}, (kl)\}(jl)^{-1}\}(ik)(jk)(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ji)^{-1} \\
\equiv & \{\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}, \{(jl), (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (jl)(kl)\}\{(il)^{-1}, (jl)^{-1}(kl)^{-1} \\
& (jl)(kl)\}\{(kl), (jl)(kl)\}\{(jl)^{-1}, (kl)\}\}(jk)(ik)(jk)(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ji)^{-1} \\
\equiv & \{(kl)^\varepsilon, (jl)(il)(jl)(il)^{-1}(jl)^{-1}(kl)\}(jk)(ik)(jk)(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ji)^{-1}.
\end{aligned}$$

(9) $\wedge$ (9)

Let $f = (ji)^{-1}(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (ik)^{-1}(jk)^{-1}\}(ji)^{-1}$, $g = (jk)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1}$, $j < i < k < l$. Then $w = (ji)^{-1}(jk)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (ji)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (ik)^{-1}(jk)^{-1}\}(ji)^{-1}(jl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (ji)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(jl)^{-1}\}, (kl)^{-1}\{(jl)^{-1}, (il)^{-1}(jl)^{-1}\}\}\{(jk)^{-1}, (ik)^{-1}(jk)^{-1}\}(ji)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(il)(jl)^{-1}(il)^{-1}(jl)^{-1}\} \\
& \{(jk)^{-1}, (ik)^{-1}(jk)^{-1}\}(ji)^{-1} \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \{(jk)^{-1}, (ik)^{-1}(jk)^{-1}\}(ji)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (jk)(ik)(jk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, \{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}\{(il)^{-1}, (kl)^{-1}(il)^{-1}\}(jl)^{-1}\}(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ji)^{-1} \\
\equiv & (jk)(ik)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, \{(kl)^{-1}, (jl)^{-1}\} \\
& \{(il)^{-1}, (kl)(jl)(kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(jl)^{-1}, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\}(jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)(ji)^{-1} \\
\equiv & (jk)\{(jl)^\varepsilon, \{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}(jl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (il)(kl)\} \\
& \{(il)^{-1}, (kl)\}(jl)^{-1}\}(ik)(jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)(ji)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (jl)(kl)\}, \{(il), (jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(kl)\} \\
& \{(kl), (jl)(kl)\}\}\{(jl)^{-1}, (kl)\}\{(kl)^{-1}, (jl)(kl)\}\{(il)^{-1}, (jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(kl)\} \\
& \{(jl)^{-1}, (kl)\}\}(jk)(ik)(jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)(ji)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(il)(jl)^{-1}(il)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(jk)^{-1}, (ik)^{-1}(jk)^{-1}\}(ji)^{-1}.
\end{aligned}$$

(9) $\wedge$ (10)

Let $f = (ji)^{-1}(jk) - \{(jk), (ik)^{-1}(jk)^{-1}\}(ji)^{-1}$, $g = (jk)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk)$, $j < i < k < l$. Then $w = (ji)^{-1}(jk)(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (ji)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk) - \{(jk), (ik)^{-1}(jk)^{-1}\}(ji)^{-1}(jl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (ji)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(jl)^{-1}(kl)\}\{(jk), (ik)^{-1}(jk)^{-1}\}(ji)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(jk), (ik)^{-1}(jk)^{-1}\}(ji)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (jk)(ik)(jk)\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(il)^{-1}(jl)^{-1}\}(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ji)^{-1} \\
\equiv & (jk)(ik)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (jl)(kl)\}\{(il)^{-1}, (jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(kl)\} \\
& \{(jl)^{-1}, (kl)\}\}(jk)(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ji)^{-1} \\
\equiv & (jk)\{(jl)^\varepsilon, \{(il)^{-1}, (kl)\}(jl)^{-1}\}(ik)(jk)(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ji)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, \{\{(il)^{-1}, (jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(kl)\}, \{(kl), (jl)(kl)\}\} \\
& \{(jl)^{-1}, (kl)\}\}(jk)(ik)(jk)(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ji)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(jl)^{-1}(kl)\}\{(jk), (ik)^{-1}(jk)^{-1}\}(ji)^{-1}.
\end{aligned}$$

(9) $\wedge$ (11)

Let $f = (ip)^{-1}(ik)^{-1} - \{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1}$, $i < p < k$, $g = (ik)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}$, $i < j < k < l$. Then $w = (ip)^{-1}(ik)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (ip)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} - \{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1}(jl)^\varepsilon.$$

There are three cases to consider.

1) $p < j, i < p < j < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (ip)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (kl)\{(il), (pl)^{-1}(il)^{-1}\}(kl)^{-1}\{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(il)^{-1}\}\} \\
& \{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (ik)(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}(ip)^{-1} \\
\equiv & (ik)(pk)(ik)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(kl), (pl)^{-1}\}(il) \\
& \{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\}(il)^{-1}\}(pk)^{-1}(ik)^{-1}(ip)^{-1} \\
\equiv & (ik)(pk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(kl), (il)^{-1}\}\{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\} \\
& , \{(pl)^{-1}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(il)^{-1}, (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(pk)^{-1}(ik)^{-1}(ip)^{-1} \\
\equiv & (ik)\{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\}\{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}, (il)^{-1} \\
& \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\{(pl)^{-1}, (kl)\}(il)^{-1}\}\}(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(ik)^{-1}(ip)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}\{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}, \\
& \{(il)^{-1}, (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}\{(pl)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}\}\{(il)^{-1}, (kl)\}\} \\
& (ik)(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(ik)^{-1}(ip)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (kl)\{(il), (pl)^{-1}(il)^{-1}\}(kl)^{-1}\{(il), (pl)^{-1}(il)^{-1}\}\} \\
& \{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1}.
\end{aligned}$$

2) $p = j, i < p = j < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (ip)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} \\
= & (ij)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)\{(il), (jl)^{-1}(il)^{-1}(kl)^{-1}\}\{(il)^{-1}, (jl)^{-1}(il)^{-1}\}\} \\
& \{(ik)^{-1}, (jk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ij)^{-1} \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
= & \{(ik)^{-1}, (jk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ij)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (ik)(jk)(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}\}(ij)^{-1} \\
\equiv & (ik)(jk)(ik)^{-1}(jk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \\
& \{(il)^{-1}, (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(ij)^{-1} \\
\equiv & (ik)(jk)(ik)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, (il)^{-1}\}(jk)^{-1}(ik)^{-1}(ij)^{-1} \\
\equiv & (ik)(jk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}\{(jl)^{-1}, (kl)(il) \\
& (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(il)^{-1}, (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)^{-1}(ij)^{-1} \\
\equiv & (ik)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (jl)(kl)\}, (il)^{-1}\{(kl)^{-1}, (jl)(kl)\}\} \\
& \{(jl)^{-1}, (kl)\}(il)^{-1}\}(jk)(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)^{-1}(ij)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}\{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}, \\
& \{(jl), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}\{(kl), (il)(kl)\}\}, \{(il)^{-1}, (kl)\}\{(kl)^{-1}, (il)(kl)\} \\
& \{(jl)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}\{(il)^{-1}, (kl)\}\}(ik)(jk)(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)^{-1}(ij)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)\{(il), (jl)^{-1}(il)^{-1}\}(kl)^{-1}\{(il)^{-1}, (jl)^{-1}(il)^{-1}\}\} \\
& \{(ik)^{-1}, (jk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ij)^{-1}.
\end{aligned}$$

3) $p > j, i < j < p < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (ip)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (pl)(il)(pl)^{-1}(il)^{-1}(kl)\{(il), (pl)^{-1}(il)^{-1}\}(kl)^{-1} \\
& \{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (ik)(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(ik)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (pl)(il)(pl)^{-1}(il)^{-1}\}(ip)^{-1} \\
\equiv & (ik)(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(pl), (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\} \\
& \{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(pl)^{-1}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(il)^{-1}, (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(ik)^{-1}(ip)^{-1} \\
\equiv & (ik)(pk)(ik)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, \{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}(il)\{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\} \\
& \{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}(il)^{-1}\}(pk)^{-1}(ik)^{-1}(ip)^{-1} \\
\equiv & (ik)(pk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{\{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\} \\
& \{(pl)^{-1}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}\}\{(il)^{-1}, (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(pk)^{-1}(ik)^{-1}(ip)^{-1} \\
\equiv & (ik)\{(jl)^\varepsilon, \{(il), \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}(il)^{-1}\{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\{(pl)^{-1}, (kl)\}\} \\
& (il)^{-1}\}(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(ik)^{-1}(ip)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{\{(il), (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}, \\
& \{(pl), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}\{(kl), (il)(kl)\}\}\{(il)^{-1}, (kl)\}\{(kl)^{-1}, (il)(kl)\} \\
& \{(pl)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}\{(il), (kl)\}\}\{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (pl)(il)(pl)^{-1}(il)^{-1}(kl)\{(il), (pl)^{-1}(il)^{-1}\}(kl)^{-1} \\
& \{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(il)^{-1}\}\}\{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1}.
\end{aligned}$$

(9) $\wedge$ (12)

Let $f = (ip)^{-1}(ik) - \{(ik), (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1}, i < p < k, g = (ik)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik), i < j < k < l$. Then $w = (ip)^{-1}(ik)(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (ip)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) - \{(ik), (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1}(jl)^\varepsilon.$$

There are three cases to consider.

1) $p < j, i < p < j < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (ip)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, \{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(il)^{-1}\}(kl)^{-1}\{(il), (pl)^{-1}(il)^{-1}\}(kl)\} \\
& \{(ik), (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(ik), (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (ik)(pk)(ik)\{(jl)^\varepsilon, (kl)\{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}(il)^{-1}\}\}(pk)^{-1}(ik)^{-1}(ip)^{-1} \\
\equiv & (ik)(pk)\{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}\{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}, \\
& \{(pl)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}\{(il)^{-1}, (kl)\}\}\}(ik)(pk)^{-1}(ik)^{-1}(ip)^{-1} \\
\equiv & (ik)\{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\}\{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}, \\
& (il)\{(pl)^{-1}, (kl)\}(il)^{-1}\}\}(pk)(ik)(pk)^{-1}(ik)^{-1}(ip)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}\{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}, \{(il), (kl)\}, \\
& \{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}\{(pl)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}\{(kl), (il)(kl)\} \\
& \{(il)^{-1}, (kl)\}\}\{(ik), (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, \{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(il)^{-1}\}(kl)^{-1}\{(il), (pl)^{-1}(il)^{-1}\}(kl)\} \\
& \{(ik), (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1}.
\end{aligned}$$

2) $p = j, i < p = j < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (ip)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) \\
= & (ij)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(jl)^{-1}(il)^{-1}(kl)^{-1}\{(il), (jl)^{-1}(il)^{-1}\}(kl)\} \\
& \{(ik), (jk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ij)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(ik), (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (ik)(jk)(ik)\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}(il)^{-1}\}(jk)^{-1}(ik)^{-1}(ij)^{-1} \\
\equiv & (ik)(jk)\{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}\{(jl)^{-1}, \\
& (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}\{(il)^{-1}, (kl)\}\} \times (ik)(jk)^{-1}(ik)^{-1}(ij)^{-1} \\
\equiv & (ik)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, (il)^{-1}\{(kl)^{-1}, (jl)(kl)\}(il)\{(jl)^{-1}, (kl)\}(il)^{-1}\} \\
& (jk)(ik)(jk)^{-1}(ik)^{-1}(ij)^{-1} \\
\equiv & \{\{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}\}, \{(il)^{-1}, (kl)\}\{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}, \\
& \{(jl), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}\{(kl), (il)(kl)\}\{(il), (kl)\}\{(jl)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1} \\
& (il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}\{(il)^{-1}, (kl)\}\}(ik)(jk)(ik)(jk)^{-1}(ik)^{-1}(ji)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(jl)^{-1}(il)^{-1}(kl)^{-1}\{(il), (jl)^{-1}(il)^{-1}\}(kl)\} \\
& \{(ik), (jk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ij)^{-1}.
\end{aligned}$$

3) $p > j, i < j < p < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (ip)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (pl)(il)(pl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(il)^{-1}\}(kl)^{-1} \\
& \{(il), (pl)^{-1}(il)^{-1}\}(kl)\}\{(ik), (pk)^{-1}(jk)^{-1}\}(ip)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(pl)(il)(pl)^{-1}(il)^{-1}(kl)\}\{(ik), (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1} \text{ and} \\
& \{(ik), (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
= & (ik)(pk)(ik)\{(jl)^\varepsilon, \{(il), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}(il)^{-1}\}(pk)^{-1}(ik)^{-1}(ip)^{-1} \\
\equiv & (ik)(pk)\{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{\{(il), (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (il)(kl)\} \\
& \{(pl)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}\{(il)^{-1}, (kl)\}\}(ik)(pk)^{-1}(ik)^{-1}(ip)^{-1} \\
\equiv & (ik)\{(jl)^\varepsilon, \{(pl), (kl)\}(il)\{(pl)^{-1}, (kl)\}(il)^{-1}\}(pk)(ik)(pk)^{-1}(ik)^{-1}(ip)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{\{(pl), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}\} \\
& \{(il), (kl)\}\{\{(pl)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}\}\{(il)^{-1}, (kl)\}\} \\
& (ik)(pk)(ik)(pk)^{-1}(ik)^{-1}(ip)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(pl)(il)(pl)^{-1}(il)^{-1}(kl)\}\{(ik), (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1}.
\end{aligned}$$

(9) $\wedge$ (13)

Let $f = (ip)^{-1}(ik)^\delta - \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1}$, $g = (ik)^\delta(jl)^\varepsilon - (jl)^\varepsilon(ik)^\delta$, $j < i < p < k < l$ or $i < p < k < j < l$. Then $w = (ip)^{-1}(ik)^\delta(jl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= (ip)^{-1}(jl)^\varepsilon(ik)^\delta - \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1}(jl)^\varepsilon. \\
&\equiv (jl)^\varepsilon\{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1} - (jl)^\varepsilon\{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(ik)^{-1}\}(ip)^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(10) $\wedge$ (7)

Let $f = (ji)(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (ik)\}(ji)$, $g = (jk)^{-1}(kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1}$, $j < i < k < l$. Then $w = (ji)(jk)^{-1}(kl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (ji)\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (ik)\}(ji)(kl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$(ji)\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1} \equiv \{(kl)^\varepsilon, (il)^{-1}(jl)^{-1}(il)\}\{(jk)^{-1}, (ik)\}(ji) \quad \text{and}$$

$$\begin{aligned}
& \{(jk)^{-1}, (ik)\}(ji)(kl)^\varepsilon \\
\equiv & (ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)(kl)^\varepsilon(ji) \\
\equiv & (ik)^{-1}(jk)^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (il)(kl)\}(ik)(ji) \\
\equiv & (ik)^{-1}\{\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}, \{(il), (kl)(jl)(kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(kl), (jl)^{-1}\}\}(jk)^{-1}(ik)(ji) \\
\equiv & \{\{(kl)^\varepsilon, (il)^{-1}\}, (jl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}\{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\} \\
& \{(kl), (il)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)(ji) \\
\equiv & \{(kl)^\varepsilon, (il)^{-1}(jl)^{-1}(il)\}\{(jk)^{-1}, (ik)\}(ji).
\end{aligned}$$

(10) $\wedge$ (8)

Let $f = (ji)(jk) - \{(jk), (ik)\}(ji)$, $g = (jk)(kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk)$, $j < i < k < l$. Then $w = (ji)(jk)(kl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (ji)\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk) - \{(jk), (ik)\}(ji)(kl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$(ji)\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk) \equiv \{(kl)^\varepsilon, (il)^{-1}(jl)(il)(kl)\}\{(jk), (ik)\}(ji) \quad \text{and}$$

$$\begin{aligned} & \{(jk), (ik)\}(ji)(kl)^\varepsilon \\ \equiv & (ik)^{-1}(jk)\{(kl)^\varepsilon, (il)(kl)\}(ik)(ji) \\ \equiv & (ik)^{-1}\{\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}, \{(il), (jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(kl)\}\{(kl), (jl)(kl)\}\}(jk)(ik)(ji) \\ \equiv & \{\{(kl)^\varepsilon, (il)^{-1}\}, (jl)\{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(jk)(ik)(ji) \\ \equiv & \{(kl)^\varepsilon, (il)^{-1}(jl)(il)(kl)\}\{(jk), (ik)\}(ji). \end{aligned}$$

(10) $\wedge$ (9)

Let $f = (ji)(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (ik)\}(ji)$, $g = (jk)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1}$, $j < i < k < l$. Then $w = (ji)(jk)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (ji)\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (ik)\}(ji)(jl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned} & (ji)\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1} \\ \equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)(kl)^{-1}(il)^{-1}(jl)^{-1}(il)\}\{(jk)^{-1}, (ik)\}(ji) \quad \text{and} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \{(jk)^{-1}, (ik)\}(ji)(jl)^\varepsilon \\ \equiv & (ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)\{(jl)^\varepsilon, (il)\}(ji) \\ \equiv & (ik)^{-1}(jk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, \{(il), (kl)\}\}(ik)(ji) \\ \equiv & (ik)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, \{(kl)^{-1}, (jl)^{-1}\}\} \\ & \{(il), (kl)(jl)(kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(kl), (jl)^{-1}\}\}(jk)^{-1}(ik)(ji) \\ \equiv & \{(jl)^\varepsilon, \{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}(jl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}\} \\ & \{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(jk)^{-1}(ik)(ji) \\ \equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)(kl)^{-1}(il)^{-1}(jl)^{-1}(il)\}\{(jk)^{-1}, (ik)\}(ji). \end{aligned}$$

(10) $\wedge$ (10)

Let $f = (ji)(jk) - \{(jk), (ik)\}(ji)$, $g = (jk)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk)$, $j < i < k < l$. Then $w = (ji)(jk)(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (ji)\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk) - \{(jk), (ik)\}(ji)(jl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (ji)\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)(kl)\}\{(jk), (ik)\}(ji) \quad \text{and} \\
& \{(jk), (ik)\}(ji)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (ik)^{-1}(jk)\{(jl)^\varepsilon, \{(il), (kl)\}\}(ik)(ji) \\
\equiv & (ik)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, \{\{(il), (jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(kl)\}, \{(kl), (jl)(kl)\}\}\}(jk)(ik)(ji) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, \{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(jk)(ik)(ji) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)(kl)\}\{(jk), (ik)\}(ji).
\end{aligned}$$

(10) $\wedge$ (11)

Let $f = (ip)(ik)^{-1} - \{(ik)^{-1}, (pk)\}(ip)$, $g = (ik)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}$, $i < p < k$, $i < j < k < l$. Then $w = (ip)(ik)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (ip)\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} - \{(ik)^{-1}, (pk)\}(ip)(jl)^\varepsilon.$$

There are three cases to consider.

1) $p < j, i < p < j < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (ip)\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (kl)\{(il), (pl)\}(kl)^{-1}\{(il)^{-1}, (pl)\}\}\{(ik)^{-1}, (pk)\}(ip) \quad \text{and} \\
& \{(ik)^{-1}, (pk)\}(ip)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (pk)^{-1}(ik)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}(pk)(ip) \\
\equiv & (pk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(pl)^{-1}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\} \\
& \{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}\{(pl), (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}(ik)^{-1}(pk)(ip) \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{\{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\}(il)^{-1}\{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\} \\
& \{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\}(pk)^{-1}(ik)^{-1}(pk)(ip) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (kl)\{(il), (pl)\}(kl)^{-1}\{(il)^{-1}, (pl)\}\}\{(ik)^{-1}, (pk)\}(ip).
\end{aligned}$$

2) $p = j, i < p = j < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (ip)\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} \\
= & (ij)\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)(jl)(kl)\{(il), (jl)\}(kl)^{-1}\{(il)^{-1}, (jl)\}\}\{(ik)^{-1}, (jk)\}(ij) \quad \text{and} \\
& \{(ik)^{-1}, (pk)\}(ip)(jl)^\varepsilon = (jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)(ij)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)\{(jl)^\varepsilon, (il)(jl)\}(ij) \\
\equiv & (jk)^{-1}(ik)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, (il)\{(jl), (kl)\}\}(jk)(ij) \\
\equiv & (jk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(kl), (il)^{-1}\}\{(il), (kl)^{-1}(il)^{-1}\} \\
& \{\{(jl), (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(kl), (il)^{-1}\}\}\}(ik)^{-1}(jk)(ij) \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, \{(il), \{(kl)^{-1}, (jl)^{-1}\}(il)^{-1}\{(kl)^{-1}, (jl)^{-1}\}\} \\
& \{(jl), (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(kl), (jl)^{-1}\}\}(jk)^{-1}(ik)^{-1}(ik)(ij) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)(jl)(kl)\{(il), (jl)\}(kl)^{-1}\{(il)^{-1}, (jl)\}\}\{(ik)^{-1}, (jk)\}(ij).
\end{aligned}$$

3) $p > j, i < j < p < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (ip)\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(pl)^{-1}(il)(pl)(kl)\{(il), (pl)\}(kl)^{-1} \\
& \{(il)^{-1}, (pl)\}\}\{(ik)^{-1}, (pk)\}(ip) \quad \text{and} \\
& \{(ik)^{-1}, (pk)\}(ip)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (pk)^{-1}(ik)^{-1}(pk)\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(pl)^{-1}(il)(pl)\}(ip) \\
\equiv & (pk)^{-1}(ik)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}\{(pl)^{-1}, (kl)\}(il)\{(pl), (kl)\}\}(pk)(ip) \\
\equiv & (pk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(il)^{-1}, (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\}\{(pl)^{-1}, \\
& (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(kl), (il)^{-1}\}\{(il), (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(pl), (kl)(il) \\
& (kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(kl), (il)^{-1}\}\}\{(ik)^{-1}(pk)(ip) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}\}\{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(kl), (pl)^{-1}\}\{(il), \{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\} \\
& (il)^{-1}\}\}\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(kl), (pl)^{-1}\}\}(pk)^{-1}(ik)^{-1}(pk)(ip) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(pl)^{-1}(il)(pl)(kl)\{(il), (pl)\}(kl)^{-1}\{(il)^{-1}, (pl)\}\}\{(ik)^{-1}, (pk)\}(ip).
\end{aligned}$$

(10) $\wedge$ (12)

Let $f = (ip)(ik) - \{(ik), (pk)\}(ip)$, $g = (ik)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik)$, $i < p < k, i < j < k < l$. Then $w = (ip)(ik)(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (ip)\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) - \{(ik), (pk)\}(ip)(jl)^\varepsilon.$$

There are three cases to consider.

1) $p < j, i < p < j < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (ip)\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, \{(il)^{-1}, (pl)\}(kl)^{-1}\{(il), (pl)\}(kl)\}\{(ik), (pk)\}(ip) \quad \text{and} \\
& \{(ik), (pk)\}(ip)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (pk)^{-1}(ik)\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}(pk)(ip) \\
\equiv & (pk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(pl)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\} \\
& \{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}\{(pl), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}\{(kl), (il)(kl)\}\}(ik)(pk)(ip) \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{\{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\}, (il)\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\} \\
& \{(kl), (pl)^{-1}\}\}(jk)^{-1}(ik)(pk)(ip) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, \{(il)^{-1}, (pl)\}(kl)^{-1}\{(il), (pl)\}(kl)\}\{(ik), (pk)\}(ip).
\end{aligned}$$

2) $p = j, i < p = j < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (ip)\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) \\
&= (ij)\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) \\
&\equiv \{\{(jl)^\varepsilon, (il)(jl)\}, \{(il)^{-1}, (jl)\}(kl)^{-1}\{(il), (jl)\}(kl)\}\{(ik), (jk)\}(ij) \\
&\equiv \{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}(il)(jl)(kl)\}(jk)^{-1}(ik)(jk)(ij) \quad \text{and} \\
& \{(ik), (pk)\}(ip)(jl)^\varepsilon \\
&\equiv (jk)^{-1}(ik)(jk)(ij)(jl)^\varepsilon \\
&\equiv (jk)^{-1}(ik)\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)\{(jl), (kl)\}\}(jk)(ij) \\
&\equiv (jk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}\{(il), (kl)\} \\
&\quad \{\{(jl), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}\}\}(ik)(jk)(ij) \\
&\equiv \{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, (il)\{(jl), (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(kl), (jl)^{-1}\}\}(jk)^{-1}(ik)(jk)(ij) \\
&\equiv \{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}(il)(jl)(kl)\}(jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)(ij).
\end{aligned}$$

3) $p > j, i < j < p < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (ip)\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) \\
&\equiv \{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(pl)^{-1}(il)(pl)\}, \{(il)^{-1}, (pl)\}(kl)^{-1}\{(il), (pl)\}(kl)\}\{(ik), (pk)\}(ip) \\
&\equiv \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(pl)^{-1}(il)(pl)(kl)\}(pk)^{-1}(ik)(pk)(ip) \quad \text{and} \\
& \{(ik), (pk)\}(ip)(jl)^\varepsilon \\
&\equiv (pk)^{-1}(ik)\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}\{(pl)^{-1}, (kl)\}(il)\{(pl), (kl)\}\}(pk)(ip) \\
&\equiv (pk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(il)^{-1}, (kl)\} \\
&\quad \{\{(pl)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}\{(il), (kl)\} \\
&\quad \{\{(pl), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}\}\}(ik)(pk)(ip) \\
&\equiv \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}\{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\}\{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}(il) \\
&\quad \{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\}(pk)^{-1}(ik)(pk)(ip) \\
&\equiv \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(pl)^{-1}(il)(pl)(kl)\}(pk)^{-1}(ik)(pk)(ip).
\end{aligned}$$

(10) $\wedge$ (13)

Let $f = (ip)(ik)^\delta - \{(ik)^\delta, (pk)\}(ip)$, $g = (ik)^\delta(jl)^\varepsilon - (jl)^\varepsilon(ik)^\delta$, $j < i < p < k < l$, or, $i < p < k < j < l$. Then $w = (ip)(ik)^\delta(jl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= (ip)(jl)^\varepsilon(ik)^\delta - \{(ik)^\delta, (pk)\}(ip)(jl)^\varepsilon \\
&\equiv (jl)^\varepsilon(ip)(ik)^\delta - (jl)^\varepsilon\{(ik)^\delta, (pk)\}(ip) \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(11) $\wedge$ (7)

Let $f = (pq)^{-1}(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}$, $g = (jk)^{-1}(kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1}$, $p < j < q < k < l$. Then $w = (pq)^{-1}(jk)^{-1}(kl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pq)^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(kl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (pq)^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1} \\
\equiv & \{(kl)^\varepsilon, \{(jl)^{-1}, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}\}\{(jk)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(jk)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(kl)^\varepsilon \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(kl)^\varepsilon(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(pk)(qk)^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(pk)\{\{(kl)^\varepsilon, (ql)^{-1}\}, (pl)^{-1}\}(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)\{\{(kl)^\varepsilon, (pl)(kl)\}, \{(ql)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\} \\
& \{(pl)^{-1}, (kl)\}\}(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)^{-1}\{\{(kl)^\varepsilon, (ql)(kl)\}, (pl)\{(ql)^{-1}, (kl)\}(pl)^{-1}\} \\
& (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}\{\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}, \{(ql), (kl)(jl)(kl)^{-1}(jl)^{-1}\} \\
& \{(kl), (jl)^{-1}\}\}, (pl)\{\{(ql)^{-1}, (kl)(jl)(kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, \{(kl), (jl)^{-1}\}\}(pl)^{-1}\} \\
& (jk)^{-1}(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}\{\{(kl)^\varepsilon, (ql)^{-1}\}, (jl)^{-1}\{(pl), \{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\} \\
& \{(ql)^{-1}, (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}\{(kl), (ql)^{-1}\}\}(pl)^{-1}\}(qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)\{\{(kl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\}, \{(ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(jl)^{-1}, (kl)(pl) \\
& (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)(pl) \\
& (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)\{\{(kl)^\varepsilon, (ql)(kl)\}, \{(jl)^{-1}, \{(ql), (kl)\}\{(kl), (ql)(kl)\}(pl)\}\{(kl)^{-1}, (ql)(kl)\} \\
& \{(ql)^{-1}, (kl)\}(pl)^{-1}\}(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & \{\{(kl)^\varepsilon, (pl)(kl)\}, \{\{(jl)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\} \\
& \{(kl), (pl)(kl)\}\{(pl), (kl)\}\{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\{(ql)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\} \\
& \{(pl)^{-1}, (kl)\}\{(jk)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1} \\
\equiv & \{(kl)^\varepsilon, \{(jl)^{-1}, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}\}\{(jk)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}.
\end{aligned}$$

(11) $\wedge$ (8)

Let $f = (pq)^{-1}(jk) - \{(jk), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}$, $g = (jk)(kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk)$, $p < j < q < k < l$. Then $w = (pq)^{-1}(jk)(kl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pq)^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk) - \{(jk), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(kl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (pq)^{-1}\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk) \\
\equiv & \{(kl)^\varepsilon, \{(jl), (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}(kl)\}\{(jk), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(jk), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(kl)^\varepsilon \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)\{(kl)^\varepsilon, (ql)(kl)(pl)\{(ql)^{-1}, (kl)\}(pl)^{-1}\} \\
& (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}\{\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}, \{(ql), (jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(kl)\} \\
& \{(kl), (jl)(kl)\}(pl)\{\{(ql)^{-1}, (jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(kl)\}\{(kl), (jl)(kl)\}\}(pl)^{-1}\} \\
& (jk)(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}\{\{(kl)^\varepsilon, (ql)^{-1}\}, (jl)\{(pl), \{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)^{-1} \\
& (ql)^{-1}\}\}\{(kl), (ql)^{-1}\}(pl)^{-1}\}(qk)^{-1}(jk)(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)\{\{(kl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\}, \{(ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(jl), (kl)(pl)(kl)^{-1} \\
& (pl)^{-1}\}\{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)(pl) \\
& (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)\{\{(kl)^\varepsilon, (ql)(kl)\}, \{(jl), \{(ql), (kl)\}\{(kl), (ql)(kl)\}(pl)\}\{(ql)^{-1}, (kl)\}(pl)^{-1}\} \\
& (qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & \{\{(kl)^\varepsilon, (pl)(kl)\}, \{(jl), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\} \\
& \{(kl), (pl)(kl)\}\{(pl), (kl)\}\{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\{(ql)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\} \\
& \{(kl), (pl)(kl)\}\{(pl)^{-1}, (kl)\}\}\{(jk), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1} \\
\equiv & \{(kl)^\varepsilon, \{(jl), (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}(kl)\}\{(jk), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}.
\end{aligned}$$

(11) $\wedge$ (9)

Let $f = (pq)^{-1}(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}$, $g = (jk)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1}$, $p < j < q < k < l$. Then $w = (pq)^{-1}(jk)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pq)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(jl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (pq)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}(kl)^{-1}\{(jl)^{-1}, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}\} \\
& \{(jk)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(jk)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(pk)(qk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \\
& \{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& \{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(pk)\{(jl)^\varepsilon, \{(pl), \{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\} \\
& \{(ql)^{-1}, (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}\}(pl)^{-1}\}(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)\{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{\{(pl), (kl)\}, \\
& \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\{(ql)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\}(pl)^{-1}, (kl)\}\}(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, \{(ql), (kl)\}(pl)\{(ql)^{-1}, (kl)\}(pl)^{-1}\} \\
& (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, \{\{(ql), (kl)(jl)(kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, \\
& \{(kl), (jl)^{-1}\}\}(pl)\{\{(ql)^{-1}, (kl)(jl)(kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, \{(kl), (jl)^{-1}\}\}(pl)^{-1}\} \\
& (jk)^{-1}(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, \{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}(jl)^{-1}\{\{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}, \\
& \{(kl), (ql)^{-1}\}\}(pl)\{\{(ql)^{-1}, (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}, \{(kl), (ql)^{-1}\}\}(pl)^{-1}\} \\
& (qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& \{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(jl)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& \{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& \{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)\{(jl)^\varepsilon, \{(ql), (kl)\}\{(kl), (ql)(kl)\}(pl)\{(kl), (ql)(kl)\}\{(jl)^{-1}, \{(ql), (kl)\} \\
& \{(kl), (ql)(kl)\}(pl)\}\{(kl)^{-1}, (ql)(kl)\}\{(ql)^{-1}, (kl)\}(pl)^{-1}\} \\
& (qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{\{(pl), (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\{(ql)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1} \\
& (pl)(kl)\}\}\{(kl), (pl)(kl)\}\{\{(jl)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{\{(pl), (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\} \\
& \{(ql)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\}\}\{(pl)^{-1}, (kl)\}\{(jk)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}(kl)^{-1}\{(jl)^{-1}, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}\} \\
& \{(jk)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}.
\end{aligned}$$

(11) $\wedge$ (10)

Let $f = (pq)^{-1}(jk) - \{(jk), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}$, $g = (jk)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk)$, $p < j < q < k < l$. Then $w = (pq)^{-1}(jk)(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pq)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk) - \{(jk), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(jl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (pq)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}(kl)\}\{(jk), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(jk), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)\{(jl)^\varepsilon, \{(ql), (kl)\}(pl)\{(ql)^{-1}, (kl)\}(pl)^{-1}\} \\
& (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, \{\{(ql), (jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(kl)\}, \{(kl), (jl)(kl)\}\}(pl) \\
& \{\{(ql)^{-1}, (jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(kl)\}, \{(kl), (jl)(kl)\}(pl)^{-1}\}(jk)(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1}, \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, \{(kl), (ql)^{-1}\}\{\{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}, \{(kl), (ql)^{-1}\}\}(pl) \\
& \{\{(ql)^{-1}, (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}\{(kl), (ql)^{-1}\}\}(pl)^{-1}\}(qk)^{-1}(jk)(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl), (pl)^{-1}\} \\
& \{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\} \\
& (pk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)\{(jl)^\varepsilon, \{(ql), (kl)\}\{(kl), (ql)(kl)\}(pl)\{(ql)^{-1}, (kl)\}(pl)^{-1}\} \\
& (qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(kl), (pl)(kl)\} \\
& \{(pl), (kl)\}\{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\{(ql)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(kl), (pl)(kl)\} \\
& \{(pl)^{-1}, (kl)\}\}\{(jk), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}(kl)\}\{(jk), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}.
\end{aligned}$$

(11) $\wedge$ (11)

Let $f = (pq)^{-1}(ik)^{-1} - \{(ik)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}$, $p < i < q < k$, $g = (ik)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}$, $i < j < k < l$. Then $w = (pq)^{-1}(ik)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pq)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} - \{(ik)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(jl)^\varepsilon.$$

There are three cases to consider.

1) $q < j, p < i < q < j < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (pq)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (kl)\{(kl)^{-1}, \{(il)^{-1}, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}\}\} \\
& \{(ik)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(ik)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^{-1}(qk)(pk)(qk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& (pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^{-1}(qk)(pk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(ql)(kl)^{-1}(ql)^{-1}\}, \{(kl), (ql)^{-1}\} \\
& (pl)\{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}(pl)^{-1}\}(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^{-1}(qk)\{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\} \\
& \{\{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}, \{(ql)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(pl)^{-1}, (kl)\}\}\} \\
& (pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (ql)^{-1}(kl)^{-1}(ql)(kl)\}, \{(kl), (ql)(kl)\} \\
& \{\{(kl)^{-1}, (ql)(kl)\}, (pl)\{(ql)^{-1}, (kl)\}(pl)^{-1}\}\}(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(kl), (il)^{-1}\}\{(kl)^{-1}, \\
& (il)^{-1}\}, \{(ql), (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}(pl)\{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)(il) \\
& (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}(pl)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(ql)(kl)^{-1}(ql)^{-1}\}, \{(kl), (ql)^{-1}\}\{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}, \\
& (il)^{-1}\{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}\{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}\{(kl), (ql)^{-1}\}(pl)\{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, \\
& (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}\{(kl), (ql)^{-1}\}(pl)^{-1}\}(qk)^{-1}(ik)^{-1}(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(kl), (pl)^{-1}\}\{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\}, \\
& \{(ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(il)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ql), (kl)(pl) \\
& (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& \{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^{-1}(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)\{\{(jl)^\varepsilon, (ql)^{-1}(kl)^{-1}(ql)(kl)\}, \{(kl), (ql)(kl)\}\{(kl)^{-1}, (ql)(kl)\}, \{(il)^{-1}, \\
& \{(ql), (kl)\}\{(kl), (ql)(kl)\}(pl)\}\{(kl)^{-1}, (ql)(kl)\}\{(ql)^{-1}, (kl)\}(pl)^{-1}\}\} \\
& (qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^{-1}(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\}\{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}, \{(il)^{-1}, \\
& (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(kl), (pl)(kl)\}\{(pl), (kl)\} \\
& \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\{(ql)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\}\{(pl)^{-1}, (kl)\}\}\} \\
& \{(ik)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1}\} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (kl)\{(kl)^{-1}, \{(il)^{-1}, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}\}\} \\
& \{(ik)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}.
\end{aligned}$$

$$2) \quad q = j, p < i < q = j < k < l.$$

$$\begin{aligned}
& (pq)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} \\
= & (pj)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\}, (kl)\{(kl)^{-1}, \{(il)^{-1}, (jl)(pl)(jl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}\} \\
& \{(ik)^{-1}, (jk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pj)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(ik)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
= & \{(ik)^{-1}, (jk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pj)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (pk)(jk)(pk)^{-1}(jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\}(pj)^{-1} \\
\equiv & (pk)(jk)(pk)^{-1}(jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)(pk)(jk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \\
& \{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}(pk)^{-1}(pj)^{-1} \\
\equiv & (pk)(jk)(pk)^{-1}(jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)(pk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, (pl)^{-1}\} \\
& (jk)^{-1}(pk)^{-1}(pj)^{-1} \\
\equiv & (pk)(jk)(pk)^{-1}(jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)\{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl)^{-1}, (pl) \\
& (kl)\}\{(jl)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(pl)^{-1}, (kl)\}\}(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(pj)^{-1} \\
\equiv & (pk)(jk)(pk)^{-1}(jk)^{-1}(ik)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, (pl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (jl)(kl)\}(pl) \\
& \{(jl)^{-1}, (kl)\}(pl)^{-1}\}(jk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(pj)^{-1} \\
\equiv & (pk)(jk)(pk)^{-1}(jk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(kl), (il)^{-1}\}(pl)^{-1} \\
& \{\{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}, \{(jl), (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}\}(pl)\{\{(jl)^{-1}, (kl) \\
& (il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(kl), (il)^{-1}\}\}(pl)^{-1}\}(ik)^{-1}(jk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(pj)^{-1} \\
\equiv & (pk)(jk)(pk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, \{(kl), (jl)^{-1}\}\{\{(kl)^{-1}, (jl)^{-1}\}, (il)^{-1} \\
& \{(kl)^{-1}, (jl)^{-1}\}\{(jl), (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(kl), (jl)^{-1}\}(pl)\}\{(kl)^{-1}, (jl)^{-1}\}\{(jl)^{-1}, \\
& (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(kl), (jl)^{-1}\}(pl)^{-1}\}(jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(pj)^{-1} \\
\equiv & (pk)(jk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{\{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\}, \{(jl)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1} \\
& (pl)^{-1}\}\{(il)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(jl), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& \{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}\{(jl)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\} \\
& (pk)^{-1}(jk)^{-1}(ik)^{-1}(jk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(pj)^{-1} \\
\equiv & (pk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, \{\{(kl)^{-1}, (jl)(kl)\}, \{(il)^{-1}, \{(jl), (kl)\}\{(kl), (jl)(kl)\}(pl)\} \\
& \{(kl)^{-1}, (jl)(kl)\}\}\{(jl)^{-1}, (kl)\}(pl)^{-1}\}(jk)(pk)^{-1}(jk)^{-1}(ik)^{-1} \\
& (jk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(pj)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\}\{\{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}, \{(jl), (pl)^{-1}(kl)^{-1} \\
& (pl)(kl)\}\{(kl), (pl)(kl)\}\{\{(il)^{-1}, (pl)(kl)(pl)^{-1}(kl)^{-1}\}, \{(jl), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\} \\
& \{(kl), (pl)(kl)\}\{(pl), (kl)\}\}\{\{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}, \{(jl), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\} \\
& \{(kl), (pl)(kl)\}\}\}\{(jl), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\}\} \\
& \{(pl)^{-1}, (kl)\}\}\{(ik)^{-1}, (jk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pj)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\}, (kl)\{(kl)^{-1}, \{(il)^{-1}, (jl)(pl)(jl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}\} \\
& \{(ik)^{-1}, (jk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pj)^{-1}.
\end{aligned}$$

3) $q > j, p < i < j < q < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (pq)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} \\
\equiv & \{ \{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(pl)^{-1}(ql)^{-1}\}, (kl)\{(il), (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}(kl)^{-1} \\
& \{(il)^{-1}, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\} \} \{ (ik)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1} \} (pq)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{ (ik)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1} \} (pq)^{-1} (jl)^\varepsilon \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^{-1}(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1} \{ (jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1} \} (pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^{-1}(qk)(pk)(qk)^{-1} \{ \{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \\
& \{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \{ (pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1} \} \{ (ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1} \} \\
& \{ (pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1} \} \} (pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^{-1}(qk)(pk) \{ (jl)^\varepsilon, \{ (ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1} \} \{ (kl), (ql)^{-1} \} \\
& (pl) \{ (kl)^{-1}, (ql)^{-1} \} \{ (ql)^{-1}, (kl)^{-1}(ql)^{-1} \} (pl)^{-1} \} (qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^{-1}(qk) \{ \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \\
& \{(ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\} \{ (kl), (pl)(kl) \} \{ (pl), (kl) \} \{ (kl)^{-1}, (pl)(kl) \} \\
& \{ (ql)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl) \} \{ (pl)^{-1}, (kl) \} \} (pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^{-1} \{ (jl)^\varepsilon, \{ (ql), (kl) \} (pl) \{ (ql)^{-1}, (kl) \} (pl)^{-1} \} \\
& (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1} \{ \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{ \{(ql), (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \\
& \{ (kl), (il)^{-1} \} \} (pl) \{ \{ (ql)^{-1}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1} \}, \{ (kl), (il)^{-1} \} \} (pl)^{-1} \} \\
& (ik)^{-1}(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1} \{ (jl)^\varepsilon, \{ (kl), (ql)^{-1} \} (il) \{ (kl)^{-1}, (ql)^{-1} \} (il)^{-1} \{ (kl)^{-1}, (ql)^{-1} \} \\
& \{ (ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1} \} \{ (kl), (ql)^{-1} \} (pl) \{ (kl)^{-1}, (ql)^{-1} \} \{ (ql)^{-1}, (kl)^{-1}(ql)^{-1} \} \\
& \{ (kl), (ql)^{-1} \} (pl)^{-1} \} (qk)^{-1}(ik)(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk) \{ \{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{ \{(il), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \\
& \{ (ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1} \} \{ (kl)^{-1}, (pl)^{-1} \} \{ (ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1} \} \} \\
& \{ (il)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1} \} \{ (ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1} \} \{ (pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1} \} \\
& \{ (ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1} \} \{ (pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1} \} \} \\
& (pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk) \{ (jl)^\varepsilon, \{ (il), \{ \{ (kl)^{-1}, (ql)(kl) \}, (pl)^{-1} \{ (kl)^{-1}, (ql)(kl) \} \{ (ql)^{-1}, (kl) \} \} \} \\
& (il)^{-1} \{ (ql), (kl) \} \{ (pl), \{ (kl)^{-1}, (ql)(kl) \} \} \{ (ql)^{-1}, (kl) \} (pl)^{-1} \} \\
& (qk)(pk)(qk)^{-1}(ik)(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & \{ \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{ \{(il), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{ \{ (kl)^{-1}, (pl)(kl) \}, \\
& \{ (ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl) \} \{ (kl), (pl)(kl) \} \{ (pl)^{-1}, (kl) \} \{ (kl)^{-1}, (pl)(kl) \} \\
& \{ (ql)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl) \} \} \{ (il)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl) \} \{ (ql), (pl)^{-1} \\
& (kl)^{-1}(pl)(kl) \} \{ (kl), (pl)(kl) \} \{ (pl), (kl) \} \{ (kl)^{-1}, (pl)(kl) \} \{ (ql)^{-1}, (pl)^{-1} \\
& (kl)^{-1}(pl)(kl) \} \{ (pl)^{-1}, (kl) \} \} \{ (ik)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1} \} (pq)^{-1} \\
\equiv & \{ \{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}, (kl) \{ (il), (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1} \} (kl)^{-1} \\
& \{ (il)^{-1}, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1} \} \} \{ (ik)^{-1}, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1} \} (pq)^{-1}.
\end{aligned}$$

(11) $\wedge$ (12)

Let $f = (pq)^{-1}(ik) - \{(ik), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}, p < i < q < k, g = (ik)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik), i < j < k < l$. Then $w = (pq)^{-1}(ik)(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pq)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) - \{(ik), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(jl)^\varepsilon.$$

There are three cases to consider.

1) $q < j, p < i < q < j < k < l$.

$$\begin{aligned} & (pq)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) \\ \equiv & \{(jl)^\varepsilon, \{(kl)^{-1}, \{(il), (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}\}(kl)\} \\ & \{(ik), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1} \quad \text{and} \\ & \{(ik), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(jl)^\varepsilon \\ \equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)\{(jl)^\varepsilon, (kl)\{(kl)^{-1}, (ql)(kl)(pl)(kl)^{-1}(ql)^{-1}(kl)(pl)^{-1}\}\} \\ & (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\ \equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\} \\ & \{\{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}, \{(ql), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}\{(kl), (il)(kl)\}(pl) \\ & \{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}\{(ql)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}\{(kl), (il)(kl)\}(pl)^{-1}\}\} \\ & (ik)(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\ \equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(ql)(kl)^{-1}(ql)^{-1}\}, \{(kl), (ql)^{-1}\}\{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}, \\ & (il)\{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}\{(kl), (ql)^{-1}\}(pl)\{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)^{-1}(ql)^{-1}\} \\ & \{(kl), (ql)^{-1}\}(pl)^{-1}\}\}(qk)^{-1}(ik)(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\ \equiv & (pk)(qk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(kl), (pl)^{-1}\}\{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\}, \\ & \{(ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(il), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ql), (kl)(pl) \\ & (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\ & \{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}\}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\ \equiv & (pk)\{\{(jl)^\varepsilon, (ql)^{-1}(kl)^{-1}(ql)(kl)\}, \{(kl), (ql)(kl)\}\{(kl)^{-1}, (ql)(kl)\}, \{(il), \\ & \{(ql), (kl)\}\{(kl), (ql)(kl)\}(pl)\}\{(ql)^{-1}, (kl)\}(pl)^{-1}\}\} \\ & (qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\ \equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\}\{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}, \{(il), (pl)^{-1} \\ & (kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(kl), (pl)(kl)\}\{(pl), (kl)\} \\ & \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\{(ql)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(kl), (pl)(kl)\} \\ & \{(pl)^{-1}, (kl)\}\}\}\{(ik), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1} \\ \equiv & \{(jl)^\varepsilon, \{(kl)^{-1}, \{(il), (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}\}(kl)\} \\ & \{(ik), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}. \end{aligned}$$

2) $q = j, p < i < q = j < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (pq)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) \\
= & (pj)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\}, \{(il)^{-1}, (jl)(pl)(jl)^{-1}(pl)^{-1}(kl)^{-1}\{(il), (jl)(pl) \\
& (jl)^{-1}(pl)^{-1}\}(kl)\}\{(ik), (jk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pj)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(ik), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
= & (pk)(jk)(pk)^{-1}(jk)^{-1}(ik)(jk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(pj)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (pk)(jk)(pk)^{-1}(jk)^{-1}(ik)\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (jl)(kl)\}(pl)\{(jl)^{-1}, (kl)\} \\
& (pl)^{-1}\}(jk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(pj)^{-1} \\
\equiv & (pk)(jk)(pk)^{-1}(jk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}(pl)^{-1} \\
& \{\{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}, \{(jl), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}\{(kl), (il)(kl)\}\}(pl)\{(jl)^{-1}, (il)^{-1} \\
& (kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}\}(pl)^{-1}\}(ik)(jk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(pj)^{-1} \\
\equiv & (pk)(jk)(pk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, \{(kl), (jl)^{-1}\}\{(kl)^{-1}, (jl)^{-1}\}, (il) \\
& \{(jl), (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(kl), (jl)^{-1}\}(pl)\}\{(jl)^{-1}, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(kl), (jl)^{-1}\}\} \\
& (pl)^{-1}\}(jk)^{-1}(ik)(jk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(pj)^{-1} \\
\equiv & (pk)(jk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\}, \{(jl)^{-1}, (kl)(pl) \\
& (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(il), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(jl), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& \{(kl), (pl)^{-1}\}\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(jl)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(pl)^{-1}, \\
& (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}(pk)^{-1}(jk)^{-1}(ik)(jk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(pj)^{-1} \\
\equiv & (pk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (jl)(kl)\}, \{(il), \{(jl), (kl)\}\{(kl), (jl)(kl)\}(pl)\}\} \\
& \{(jl)^{-1}, (kl)\}(pl)^{-1}\}(jk)(pk)^{-1}(jk)^{-1}(ik)(jk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(pj)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}, \{(jl), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\} \\
& \{(il), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(jl), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(kl), (pl)(kl)\} \\
& \{(pl), (kl)\}\{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\}\{(jl)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(kl), (pl)(kl)\} \\
& \{(pl)^{-1}, (kl)\}\}\{(ik), (jk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pj)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\}, \{(il)^{-1}, (jl)(pl)(jl)^{-1}(pl)^{-1}\}(kl)^{-1} \\
& \{(il), (jl)(pl)(jl)^{-1}(pl)^{-1}\}(kl)\}\{(ik), (jk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pj)^{-1}.
\end{aligned}$$

3) $q > j, p < i < j < q < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (pq)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(il), (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}, (kl)\} \\
& \{(ik), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(ik), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)\{(jl)^\varepsilon\{(ql), (kl)\}(pl) \\
& \{(ql)^{-1}, (kl)\}(pl)^{-1}\}(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(ql), (il)^{-1}(kl)^{-1} \\
& (il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}\}(pl)\{(ql)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\} \\
& (pl)^{-1}\}(ik)(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}\{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}(il)\{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\} \\
& \{(kl), (ql)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}, \{(kl), (ql)^{-1}\}(pl)^{-1}\} \\
& (qk)^{-1}(ik)(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(il)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& \{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\}, \{(ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(il), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& \{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \\
& \{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)\{(jl)^\varepsilon, \{(kl)^{-1}, (ql)(kl)\}, (pl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (ql)(kl)\}\{(ql)^{-1}, (kl)\}(il)\}\{(ql), \\
& (kl)\}\{(kl), (ql)(kl)\}\{(ql)^{-1}, (kl)\}, (pl)^{-1}\}(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik) \\
& (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}, \{(pl)^{-1}, (kl)\}, \\
& \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\{(ql)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(il), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\} \\
& \{(ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(kl), (pl)(kl)\}\{(ql)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \\
& \{(kl), (pl)(kl)\}\{(pl)^{-1}, (kl)\}\}\{(ik), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}(kl)^{-1}\{(il), (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}(kl)\} \\
& \{(ik), (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}.
\end{aligned}$$

(11) $\wedge$ (13)

Let $f = (pq)^{-1}(ik)^\delta - \{(ik)^\delta, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}$, $g = (ik)^\delta(jl)^\varepsilon - (jl)^\varepsilon(ik)^\delta$.
Then $w = (pq)^{-1}(ik)^\delta(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pq)^{-1}(jl)^\varepsilon(ik)^\delta - \{(ik)^\delta, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(jl)^\varepsilon.$$

There are two cases to consider.

1) $p < i < q < k, j < i < k < l$. In this case, there are three subcases to consider.

a) $p < j, p < j < i < q < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (pq)^{-1}(jl)^\varepsilon(ik)^\delta \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ik)^\delta, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(ik)^\delta, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^\delta(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl) \\
& (ql)^{-1}(pl)^{-1}\}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^\delta\{(jl)^\varepsilon, \{(ql), (kl)\}(pl)\{(ql)^{-1}, (kl)\}(pl)^{-1}\} \\
& (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}.
\end{aligned}$$

If $\delta = 1$, then

$$\begin{aligned}
& \{(ik)^\delta, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, \{\{(ql), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}\} \\
& \{\{(ql)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}(pl)^{-1}\}\}(ik)^\delta(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, \{\{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}, \{(kl), (ql)^{-1}\}\}\{(ql)^{-1}, (kl)^{-1} \\
& (ql)^{-1}\}, \{(kl), (ql)^{-1}\}(pl)^{-1}\}\}(qk)^{-1}(ik)^\delta(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& \{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& (pk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^\delta(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & (pk)\{(jl)^\varepsilon, \{(pl), \{(kl)^{-1}, (ql)(kl)\}\{(ql)^{-1}, (kl)\}\}(pl)^{-1}\} \\
& \{(ik)^\delta, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{\{(pl), (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\{(ql)^{-1}, \\
& (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\}\{(pl)^{-1}, (kl)\}\}\{(ik)^\delta, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ik)^\delta, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}.
\end{aligned}$$

If $\delta = -1$, then

$$\begin{aligned}
& \{(ik)^\delta, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, \{\{(ql), (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(kl), (il)^{-1}\}\} \\
& \{(ql)^{-1}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(kl), (il)^{-1}\}(pl)^{-1}\}\}(ik)^\delta(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1} \\
\equiv & (pk)(qk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, \{(ql), (kl)\}\{(ql)^{-1}, (kl)(pl)^{-1}\}\} \\
& (ik)^\delta(qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}(pq)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ik)^\delta, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}.
\end{aligned}$$

b) $p = j, p = j < i < q < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (pq)^{-1}(jl)^\varepsilon(ik)^\delta = (jq)^{-1}(jl)^\varepsilon(ik)^\delta \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (ql)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(ik)^\delta, (qk)(jk)(qk)^{-1}(jk)^{-1}\}(jq)^{-1} \quad \text{and} \\
& \{(ik)^\delta, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
= & \{(ik)^\delta, (qk)(jk)(qk)^{-1}(jk)^{-1}\}(jq)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (jk)(qk)(jk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^\delta(qk)(jk)(qk)^{-1}(jk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (ql)^{-1}(jl)^{-1}\}(jq)^{-1} \\
\equiv & (jk)(qk)(jk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^\delta(qk)(jk)(qk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, \\
& \{(ql)^{-1}, (kl)(jl)(kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(jl)^{-1}, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1}(jq)^{-1} \\
\equiv & (jk)(qk)(jk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^\delta(qk)(jk)\{(jl)^\varepsilon, \{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\} \\
& \{(ql)^{-1}, (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}(jl)^{-1}\}(qk)^{-1}(jk)^{-1}(jq)^{-1} \\
\equiv & (jk)(qk)(jk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^\delta(qk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (jl)(kl)\} \\
& \{(ql)^{-1}, (jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(kl)\}\{(jl)^{-1}, (kl)\}\}(jk)(qk)^{-1}(jk)^{-1}(jq)^{-1} \\
\equiv & (jk)(qk)(jk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^\delta\{(jl)^\varepsilon, \{(ql)^{-1}, (kl)\}(jl)^{-1}\} \\
& (qk)(jk)(qk)^{-1}(jk)^{-1}(jq)^{-1}.
\end{aligned}$$

If $\delta = 1$, then

$$\begin{aligned}
& \{(ik)^\delta, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (jk)(qk)(jk)^{-1}(qk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, \{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}\{(ql)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\} \\
& \{(kl), (il)(kl)\}(jl)^{-1}\}(ik)^\delta(qk)(jk)(qk)^{-1}(jk)^{-1}(jq)^{-1} \\
\equiv & (jk)(qk)(jk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, \{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)^{-1}(ql)^{-1}\} \\
& \{(kl), (ql)^{-1}\}(jl)^{-1}\}(qk)^{-1}(ik)^\delta(qk)(jk)(qk)^{-1}(jk)^{-1}(jq)^{-1} \\
\equiv & (jk)(qk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, \{(ql)^{-1}, (kl)(jl)(kl)^{-1}(jl)^{-1}\} \\
& \{(jl)^{-1}, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\}(jk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^\delta(qk)(jk)(qk)^{-1}(jk)^{-1}(jq)^{-1} \\
\equiv & (jk)\{(jl)^\varepsilon, \{(kl)^{-1}, (ql)(kl)\}\{(ql)^{-1}, (kl)\}(jl)^{-1}\} \\
& (qk)(jk)^{-1}(qk)^{-1}(ik)^\delta(qk)(jk)(qk)^{-1}(jk)^{-1}(jq)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (jl)(kl)\}\{(ql)^{-1}, (jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(kl)\} \\
& \{(jl)^{-1}, (kl)\}\}\{(ik)^\delta, (qk)(jk)(qk)^{-1}(jk)^{-1}\}(jq)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (ql)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(ik)^\delta, (qk)(jk)(qk)^{-1}(jk)^{-1}\}(jq)^{-1}.
\end{aligned}$$

If $\delta = -1$, then

$$\begin{aligned}
& \{(ik)^\delta, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (jk)(qk)(jk)^{-1}(qk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, \{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\} \\
& \{(kl), (il)^{-1}\}(jl)^{-1}\}(ik)^\delta(qk)(jk)(qk)^{-1}(jk)^{-1}(jq)^{-1} \\
\equiv & (jk)(qk)(jk)^{-1}(qk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(ql)^{-1}(kl)(jl)^{-1}\} \\
& (ik)^\delta(qk)(jk)(qk)^{-1}(jk)^{-1}(jq)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (ql)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(ik)^\delta, (qk)(jk)(qk)^{-1}(jk)^{-1}\}(jq)^{-1}.
\end{aligned}$$

c) $p > j, j < p < i < q < k < l$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &\equiv (jl)^\varepsilon \{(ik)^\delta, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1} \\
&\quad - (jl)^\varepsilon \{(ik)^\delta, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

2) $i < k < j < l, p < i < q < k$, then $p < i < q < k < j < l$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= (pq)^{-1}(jl)^\varepsilon(ik)^\delta - \{(ik)^\delta, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1}(jl)^\varepsilon \\
&\equiv (jl)^\varepsilon(pq)^{-1}(ik)^\delta - (jl)^\varepsilon \{(ik)^\delta, (qk)(pk)(qk)^{-1}(pk)^{-1}\}(pq)^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(12) $\wedge$ (7)

Let $f = (pq)(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)$, $p < j < q < k$, $g = (jk)^{-1}(kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1}$, $j < k < l$. Then $p < j < q < k < l$, $w = (pq)(jk)^{-1}(kl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pq)\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(kl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (pq)\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1} \\
\equiv & \{(kl)^\varepsilon, \{(jl)^{-1}, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}\}\{(jk)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \quad \text{and} \\
& \{(jk)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(kl)^\varepsilon \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(kl)^\varepsilon(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)\{(kl)^\varepsilon, (ql)(kl)\}(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}\{\{(kl)^\varepsilon, (pl)(kl)\}, \{(ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\}\{(kl), (pl)(kl)\}\}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}\{\{(kl)^\varepsilon, (ql)^{-1}\}, (pl)\{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}\{(kl), (ql)^{-1}\}\}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(jk)^{-1}\{\{(kl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\}, \{\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}\{(kl), (ql)^{-1}\}\}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)\{\{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(pl)^{-1}\{(pl), \{(kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(ql), (kl)(jl)(kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(kl), (jl)^{-1}\}\}\}(jk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)\{\{(kl)^\varepsilon, (pl)(kl)\}, \{(jl)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(pl)^{-1}, (kl)\}\{\{(pl), (kl)\}\{(ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\}\}\}\}(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}\{\{(kl)^\varepsilon, (ql)(kl)\}, (pl)(jl)^{-1}(pl)^{-1}\{(pl), \{(ql), (kl)\}\}\{(kl), (ql)(kl)\}\}\}(qk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(qk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}\{\{(kl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\}, \{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(jl)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\}\}(pk)^{-1}(qk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & \{\{(kl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\}, \{(jl)^{-1}, \{\{(ql)^{-1}, (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}, \{(kl), (ql)^{-1}\}(pl)\}\}\{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}\{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}\{(kl), (ql)^{-1}\}\}\{(jk)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \\
\equiv & \{(kl)^\varepsilon, \{(jl)^{-1}, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}\}\{(jk)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq).
\end{aligned}$$

(12) $\wedge$ (8)

Let $f = (pq)(jk) - \{(jk)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)$, $g = (jk)(kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk)$, $p < j < q < k < l$. Then $w = (pq)(jk)(kl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pq)\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk) - \{(jk), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(kl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (pq)\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk) \\
\equiv & \{(kl)^\varepsilon, \{jl\}, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}(kl)\{(jk), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \quad \text{and} \\
& \{(jk), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(kl)^\varepsilon \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(jk)\{(kl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(pl), (kl)^{-1}(ql)(kl)\}\}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)\{\{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}, (pl)^{-1}\{(pl), \{(kl)^{-1}, (jl)(kl)\} \\
& \{(ql), (jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(kl)\}\{(kl), (jl)(kl)\}\}\}(jk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)\{\{(kl)^\varepsilon, (pl)(kl)\}, \{(jl), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\} \\
& \{(kl), (pl)(kl)\}\{(pl)^{-1}, (kl)\}\{(pl), (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\{(ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\} \\
& \{(kl), (pl)(kl)\}\}\}(pk)(kl)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}\{\{(kl)^\varepsilon, (pl)(kl)\}, (pl)(jl)(pl)^{-1}\{(ql)^{-1}, (kl)\}(pl)\{(ql), (kl)\} \\
& \{(kl), (ql)(kl)\}\}(qk)(pk)(jk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}\{\{(kl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\}, \{\{(jl), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& \{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& \{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\}(pk)^{-1}(qk)(pk)(jk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & \{\{(kl)^\varepsilon, (ql)^{-1}\}\{(jl), (pl)^{-1}\}\{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)^{-1}(ql)^{-1}\} \\
& \{(kl), (ql)^{-1}\}(pl)\}\{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}\{(kl), (ql)^{-1}\}\}\{(jk), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \\
\equiv & \{(kl)^\varepsilon, \{(jl), (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}(kl)\}\{(jk), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq).
\end{aligned}$$

$$(12) \wedge (9)$$

Let $f = (pq)(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)$, $g = (jk)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1}$, $p < j < q < k < l$. Then $w = (pq)(jk)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pq)\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - \{(jk)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(jl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (pq)\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)(kl)^{-1}\{(jl)^{-1}, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}\} \\
& \{(jk)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \quad \text{and} \\
& \{(jk)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk) \\
& \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(ql)^{-1}, (kl)\}(pl)\{(ql), (kl)\}\}(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \\
& \{(pl)^{-1}, (kl)\}\{\{(ql)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\}\}\{(pl), (kl)\} \\
& \{\{(ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\}\}\}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(pl), \{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\} \\
& \{(kl), (ql)^{-1}\}\}\}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(jk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(pl)^{-1}, (kl)^{-1} \\
& (pl)^{-1}\}\{\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\}\} \\
& (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, (pl)^{-1}\{(pl), \{(kl)^{-1}, (jl)^{-1}\} \\
& \{(ql), (kl)(jl)(kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(kl), (jl)^{-1}\}\}\}(jk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)\{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\} \\
& \{(jl)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(pl)^{-1}(kl)\}\{\{(pl), (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\} \\
& \{(ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(kl), (pl)(kl)\}\}\}(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (ql)(kl)\}(pl)(jl)^{-1}(pl)^{-1}\{(pl), \{(ql), (kl)\} \\
& \{(kl), (ql)(kl)\}\}\}(qk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& \{\{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\}, \{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\}\{(jl)^{-1}, (kl)(pl) \\
& (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}\{\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(ql), (kl)(pl) \\
& (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\}\}(pk)^{-1}(qk)(pk)(jk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}, (pl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\} \\
& \{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}\{(kl), (ql)^{-1}\}\}\{(jl)^{-1}, (pl)^{-1}\}\{(pl), \{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\} \\
& \{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}\{(kl), (ql)^{-1}\}\}\}\{(jk)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)(kl)^{-1}\{(jl)^{-1}, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}\} \\
& \{(jk)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq).
\end{aligned}$$

(12) $\wedge$ (10)

Let $f = (pq)(jk) - \{(jk), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)$, $g = (jk)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk)$, $p < j < q < k < l$. Then $w = (pq)(jk)(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pq)\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk) - \{(jk), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(jl)^\varepsilon \equiv 0$$

since

$$\begin{aligned}
& (pq)\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)(kl)\}\{(jk), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \quad \text{and} \\
& \{(jk), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(jk)\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(pl), (kl)^{-1}(ql)(kl)\}\} \\
& (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, (pl)^{-1}\{(pl), \{(kl)^{-1}, (jl)(kl)\}\} \\
& \{(ql), (jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(kl)\}\{(kl), (jl)(kl)\}\}\}(jk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)\{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(ql)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\}\} \\
& \{(pl)^{-1}, (kl)\}\{\{(pl), (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\{(ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(ql)(kl)\}\} \\
& \{(kl), (pl)(kl)\}\}\}(pk)(jk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(kl), (ql)(kl)\}\{(pl), \{(ql), (kl)\}\{(kl), (ql)(kl)\}\}\} \\
& (qk)(pk)(jk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{\{(ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \\
& \{(kl), (pl)^{-1}\}\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}\{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\} \\
& (pk)^{-1}(qk)(pk)(jk)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, \{\{(ql)^{-1}, (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}, \{(kl), (ql)^{-1}\}(pl)\}\{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\} \\
& \{(kl), (ql)^{-1}\}\}\{(jk), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)(kl)\}\{(jk), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq).
\end{aligned}$$

(12) $\wedge$ (11)

Let $f = (pq)(ik)^{-1} - \{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)$, $p < i < q < k$, $g = (ik)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}$, $i < j < k < l$. Then $w = (pq)(ik)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pq)\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} - \{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(jl)^\varepsilon.$$

There are three cases to consider.

$$1) \quad q < j, \quad p < i < q < j < k < l.$$

$$\begin{aligned}
& (pq)\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (kl)\{(il), (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}(kl)^{-1}\{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}\} \\
& \{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \quad \text{and} \\
& \{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(jl)^\varepsilon. \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(jl)^\varepsilon(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(pk)(qk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)\{(jl)^\varepsilon, (ql)^{-1}(kl)^{-1}(ql)(kl)\} \\
& (qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \\
& \{(ql)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\{(ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\} \\
& \{(kl), (pl)(kl)\}\}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(ql)(kl)^{-1}(ql)^{-1}\}, \{\{(kl)^{-1}, \\
& (ql)^{-1}\}, (pl)\{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}\{(kl), (ql)^{-1}\}\}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(ik)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{\{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\}, \\
& \{(ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\} \\
& \{(kl), (pl)^{-1}\}\}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{\{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}, \\
& \{\{(ql)^{-1}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(kl), (il)^{-1}\}(pl)\}\{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}\{(ql), (kl)(il) \\
& (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)\{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{\{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}, \{(il)^{-1}, \\
& (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\}\{(ql)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\} \\
& \{(pl), (kl)\}\}\{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\{(ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(kl), (pl)(kl)\}\} \\
& (pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (ql)^{-1}(kl)^{-1}(ql)(kl)\}, \{\{(kl)^{-1}, (ql)(kl)\}, (pl)(il)^{-1} \\
& (pl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (ql)(kl)\}\{(ql)^{-1}, (kl)\}(pl)\{(ql), (kl)\}\}\{(kl), (ql)(kl)\}\} \\
& (qk)(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{\{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\}, \{\{(il)^{-1}, (kl)(pl) \\
& (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)(pl) \\
& (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\} \\
& \{(kl), (pl)^{-1}\}\}(pk)^{-1}(qk)(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(ql)(kl)^{-1}(ql)^{-1}\}, \{\{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}, \{(il)^{-1}, (pl)^{-1} \\
& \{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}\{(kl), (ql)^{-1}\}(pl)\{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}\} \\
& \{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}\}\{(kl), (ql)^{-1}\}\}\{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (kl)\{(il), (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}(kl)^{-1}\{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}\} \\
& \{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq).
\end{aligned}$$

2) $q = j, p < i < q = j < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (pq)\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} \\
= & (pj)\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (pl)(jl)\}, (kl)\{(il), (pl)^{-1}(jl)^{-1}(pl)(jl)\}(kl)^{-1}\{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(jl)^{-1}(pl)(jl)\}\}\{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(jk)^{-1}(pk)(jk)\}(pj) \quad \text{and} \\
& \{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(jl)^\varepsilon \\
= & \{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(jk)^{-1}(pk)(jk)\}(pj)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (jk)^{-1}(pk)^{-1}(jk)(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(jk)^{-1}(pk)(jk)\{(jl)^\varepsilon, (pl)(jl)\}(pj) \\
\equiv & (jk)^{-1}(pk)^{-1}(jk)(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(jk)^{-1}(pk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, (pl)\{(jl), (kl)\}\}(jk)(pj) \\
\equiv & (jk)^{-1}(pk)^{-1}(jk)(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(jk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\}\{(pl), (kl)\}\{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\{(jl), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(kl), (pl)(kl)\}\}(pk)(jk)(pj) \\
\equiv & (jk)^{-1}(pk)^{-1}(jk)(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, (pl)\{(jl), (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\}(jk)^{-1}(pk)(jk)(pj) \\
\equiv & (jk)^{-1}(pk)^{-1}(jk)(pk)(ik)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(jl), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\}(pk)^{-1}(jk)^{-1}(pk)(jk)(pj) \\
\equiv & (jk)^{-1}(pk)^{-1}(jk)(pk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(kl), (il)^{-1}\}(pl)\{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}(pl)^{-1}\{(pl), \{(kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(jl), (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}\}\}(ik)^{-1}(pk)^{-1}(jk)^{-1}(pk)(jk)(pj) \\
\equiv & (jk)^{-1}(pk)^{-1}(jk)\{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\}\{\{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}, \{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(pl)^{-1}, (kl)\}\}\{(pl), (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\{(jl), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(kl), (pl)(kl)\}\}(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(jk)^{-1}(pk)(jk)(pj) \\
\equiv & (jk)^{-1}(pk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, \{(kl), (jl)(kl)\}\{\{(kl)^{-1}, (jl)(kl)\}, (pl)(il)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(pl), (jl), (kl)\}\{(kl), (jl)(kl)\}\}(jk)(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(jk)^{-1}(pk)(jp)(pj) \\
\equiv & (jk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(kl), (pl)^{-1}\}\{(jl), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\{\{(il)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(jl), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\}(pk)^{-1}(jk)(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(jk)^{-1}(pk)(jk)(pj) \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, \{(il), (pl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (jl)^{-1}\}\{(jl)^{-1}, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(kl), (jl)^{-1}\}(pl)\{(kl)^{-1}, (jl)^{-1}\}(pl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (jl)^{-1}\}\{(jl)^{-1}, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(kl), (jl)^{-1}\}(pl)\{(kl)^{-1}, (jl)^{-1}\}\{(jl), (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(kl), (jl)^{-1}\}\{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(jk)^{-1}(pk)(jk)\}(pj) \\
\equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (pl)(jl)\}, (kl)\{(il), (pl)^{-1}(jl)^{-1}(pl)(jl)\}(kl)^{-1}\{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(jl)^{-1}(pl)(jl)\}\}\{(ik)^{-1}, (pk)^{-1}(jk)^{-1}(pk)(jk)\}(pj).
\end{aligned}$$

3) $q > j, p < i < j < q < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (pq)\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} \\
\equiv & \{ \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}, (kl)\{(il), (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}(kl)^{-1} \\
& \{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\} \} \{ (ik)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk) \} (pq) \quad \text{and} \\
& \{ (ik)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk) \} (pq)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(ql)^{-1}, (kl)\}(pl) \\
& \{(ql), (kl)\}\}(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}\{ \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \\
& \{(pl)^{-1}, (kl)\} \} \{ \{(ql)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\} \} \{ (pl), (kl) \} \\
& \{ \{(ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(ql)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\} \} \} (pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(pl), \{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\} \\
& \{(kl), (ql)^{-1}\}\}\}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(ik)^{-1}\{ \{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(pl)^{-1}, (kl)^{-1} \\
& (pl)^{-1}\} \} \{ \{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \} \{ (kl), (pl)^{-1}\} \} \\
& (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)\{ \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, (pl)^{-1}\{(pl), \{(kl)^{-1}(il)^{-1}\} \\
& \{(ql), (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\{(kl), (il)^{-1}\}\}\}(ik)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)\{ \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\} \} \{ (il), (pl)^{-1} \\
& (kl)^{-1}(pl)(kl)\} \} \{ (kl)^{-1}, (pl)(kl)\} \} \{ (il)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\} \} \{ \{(pl), (kl)\}, \\
& \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\} \} \{ (ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\} \} \{ (kl), (pl)(kl)\} \} \} \\
& (pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{ \{(kl)^{-1}, (ql)(kl)\}, (pl)(il)^{-1}(pl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (ql)(kl)\} \} \\
& \{(ql)^{-1}, (kl)\}(pl)\{ (ql), (kl)\} \} \{ (kl), (ql)(kl)\} \} \} (qk)(pk)(ik)^{-1} \\
& (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}\{ \{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{ \{(il), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{ \{(kl)^{-1}, \\
& (pl)^{-1}\}, \{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \} \{ (kl), (pl)^{-1}\} \} \{ (pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \} \\
& \{ (il)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \} \{ (pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \} \{ (kl)^{-1}, (pl)^{-1}\} \\
& \{ (ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \} \{ (pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \} \{ (ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& \{ (kl), (pl)^{-1}\} \} \} (pk)^{-1}(qk)(pk)(ik)^{-1}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & \{ (jl)^\varepsilon, \{ (il), \{ \{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}, (pl)^{-1}\{ \{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}, \{(kl), (ql)^{-1}\} \} \\
& (pl)\} \} \} (il)^{-1}\{ \{(ql)^{-1}, (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}, \{(kl), (ql)^{-1}\}(pl) \} \\
& \{ \{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}, \{(kl), (ql)^{-1}\} \} \} \{ (ik)^{-1}n, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk) \} \} (pq) \\
\equiv & \{ \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}, (kl)\{(il), (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}(kl)^{-1} \\
& \{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\} \} \{ (ik)^{-1}, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk) \} \} (pq).
\end{aligned}$$

(12) $\wedge$ (12)

Let $f = (pq)(ik) - \{(ik), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq), p < i < q < k, g = (ik)(jl)^\varepsilon -$

$\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik), i < j < k < l$. Then $w = (pq)(ik)(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pq)\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) - \{(ik), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(jl)^\varepsilon.$$

There are three cases to consider.

1) $q < j, p < i < q < j < k < l$.

$$\begin{aligned} & (pq)\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) \\ \equiv & \{(jl)^\varepsilon, \{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}(kl)^{-1}\{(il), (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}(kl)\} \\ & \{(ik), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \quad \text{and} \\ & \{(ik), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(jl)^\varepsilon \\ \equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(ik)\{(jl)^\varepsilon, \{(kl)^{-1}, \{(ql)^{-1}, (kl)(pl)\}(kl)^{-1}(ql)\}(kl)\} \\ & (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\ \equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)\{\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{\{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}, \{\{(ql)^{-1}, \\ & (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\}(pl)\}\{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}\{(ql), (il)^{-1}(kl)^{-1} \\ & (il)(kl)\}\}\{(kl), (il)(kl)\}\}(ik)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\ \equiv & (qk)^{-1}(qk)(pk)\{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{\{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}, \{(il), (pl)^{-1} \\ & (kl)^{-1}(pl)(kl)\}\}\{(ql)^{-1}, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\}\{(pl), (kl)\} \\ & \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\}\{(ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\} \\ & \{(kl), (pl)(kl)\}\}(qk)(ik)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\ \equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (ql)^{-1}(kl)^{-1}(ql)(kl)\}, \{\{(kl)^{-1}, (ql)(kl)\}, (pl)(il)(pl)^{-1} \\ & \{(ql)^{-1}, (kl)\}(pl)\{(ql), (kl)\}\}\{(kl), (ql)(kl)\}\}(qk)(pk)(ik)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\ \equiv & (qk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{\{(kl)^{-1}, \\ & (pl)^{-1}\}, \{\{(il), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\} \\ & \{(ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(ql), (kl)(pl) \\ & (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\}(pk)^{-1}(qk)(pk)(ik)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\ \equiv & \{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(ql)(kl)^{-1}(ql)^{-1}\}, \{\{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}, \{(il)^{-1}, (pl)^{-1} \\ & \{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}\{(ql)^{-1}, (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}\{(kl), (ql)^{-1}\}(pl)\}\{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}\{(ql), \\ & (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}\}\{(kl), (ql)^{-1}\}\}\{(ik), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \\ \equiv & \{(jl)^\varepsilon, \{(il), (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}(kl)^{-1}\{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}(kl)\} \\ & \{(ik), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq). \end{aligned}$$

2) $q = j, p < i < q = j < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (pq)\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) = (pj)\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) \\
\equiv & \{ \{(jl)^\varepsilon, (pl)(jl)\}, \{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(jl)^{-1}(pl)(jl)\}(kl)^{-1}\{(il), (pl)^{-1} \\
& (jl)^{-1}(pl)(jl)\}(kl)\} \{(ik), (pk)^{-1}(jk)^{-1}(pk)(jk)\}(pj) \quad \text{and} \\
& \{(ik), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(jl)^\varepsilon = \{(ik), (pk)^{-1}(jk)^{-1}(pk)(jk)\}(pj)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (jk)^{-1}(pk)^{-1}(jk)(pk)(ik)\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\{(pl), (jl)(kl)\}\} \\
& (pk)^{-1}(jk)^{-1}(pk)(jk)(pj) \\
\equiv & (jk)^{-1}(pk)^{-1}(jk)(pk)\{ \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(kl), (il)(kl)\} \\
& (pl)\{(kl)^{-1}(il)(kl)\}(pl)^{-1}\{(pl), \{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}\{(jl), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\} \\
& \{(kl), (il)(kl)\}\} \}(ik)(pk)^{-1}(jk)^{-1}(pk)(jk)(pj) \\
\equiv & (jk)^{-1}(pk)^{-1}(jk)\{ \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(kl), (pl)(kl)\} \{ \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}, \\
& \{(il), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\} \{(kl), (pl)(kl)\} \{(pl)^{-1}, (kl)\} \} \{ \{(pl), (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\} \\
& \{(jl), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\} \{(kl), (pl)(kl)\} \} \}(ik)(pk)^{-1}(jk)^{-1}(pk)(jp)(pj) \\
\equiv & (jk)^{-1}(pk)^{-1} \{ \{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, \{ \{(kl)^{-1}, (jl)(kl)\}, (pl)(il)(pl)^{-1} \} \\
& \{(pl), \{(jl), (kl)\} \} \{(kl), (jl)(kl)\} \}(jk)(pk)(ik)(pk)^{-1}(jk)^{-1}(pk)(jk)(pj) \\
\equiv & (jk)^{-1} \{ \{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(kl), (pl)^{-1}\} \{ \{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\}, \\
& \{(jl), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \{(kl), (pl)^{-1}\} \{ \{(il), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(pl)^{-1}, (kl)^{-1} \\
& (pl)^{-1}\} \} \{ \{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\} \{(jl)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \{(kl), (pl)^{-1}\} \\
& \{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \{(jl), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \{(kl), (pl)^{-1}\} \} \\
& (pk)^{-1}(jk)(pk)(ik)(pk)^{-1}(jk)^{-1}(pk)(jk)(pj) \\
\equiv & \{ \{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, \{(kl), (jl)^{-1}\} \{ \{(kl), (jl)^{-1}\}, (pl)^{-1} \\
& \{(kl)^{-1}, (jl)^{-1}\} \{(jl), (kl)^{-1}(jl)^{-1}\} \{(kl), (jl)^{-1}\} (pl)(il)(pl)^{-1} \} \\
& \{(kl)^{-1}, (jl)^{-1}\} \{(jl)^{-1}, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\} \{(kl), (jl)^{-1}\} (pl)\{(jl), (kl)^{-1}(jl)^{-1}\} \\
& \{(kl), (jl)^{-1}\} \{(ik), (pk)^{-1}(jk)^{-1}(pk)(jk)\}(pj) \\
\equiv & \{ \{(jl)^\varepsilon, (pl)(jl)\}, \{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(jl)^{-1}(pl)(jl)\}(kl)^{-1}\{(il), (pl)^{-1} \\
& (jl)^{-1}(pl)(jl)\}(kl)\} \{(ik), (pk)^{-1}(jk)^{-1}(pk)(jk)\}(pj).
\end{aligned}$$

3) $q > j, p < i < j < q < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (pq)\{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) \\
\equiv & \{ \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}, \{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\} \\
& (kl)^{-1}\{(il), (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}(kl)\} \{(ik), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \{(ik), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(ik)\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(pl), (kl)^{-1}(ql)(kl)\}\}(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)\{ \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, (pl)^{-1}\{(pl), \{(kl)^{-1}, (il) \\
& (kl)\}\{(ql), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}\{(kl), (il)(kl)\}\} \}(ik)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)\{ \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{ \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}, \{(il), (pl)^{-1} \\
& (kl)^{-1}(pl)(kl)\} \} \{(kl), (pl)(kl)\} \{(pl)^{-1}, (kl)\} \{ \{(pl), (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\} \\
& \{(ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\} \{(kl), (pl)(kl)\} \} \}(pk)(ik)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, \{ \{(kl)^{-1}, (ql)(kl)\}, (pl)(il)\} \}(pl)^{-1}\{(pl), \{(ql), (kl)\}\} \\
& \{(kl), (ql)(kl)\}\}(qk)(pk)(ik)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}\{ \{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{ \{(kl)^{-1}, (pl)^{-1}\}, \{(ql), (kl)(pl) \\
& (kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \{(kl), (pl)^{-1}\} \{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \{(il), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \} \\
& \{ \{(ql)^{-1}, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(kl), (pl)^{-1}\} \{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \} \{(ql), (kl)(pl) \\
& (kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \{(kl), (pl)^{-1}\} \}(pk)^{-1}(qk)(pk)(ik)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, \{ \{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}, (pl)^{-1}\{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\} \{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\} \\
& \{(kl), (ql)^{-1}\}(pl)(il)\} \} \{(ql)^{-1}, (kl)^{-1}(ql)^{-1}\} \{(kl), (ql)^{-1}\}(pl)\{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\} \\
& \{(kl), (ql)^{-1}\} \} \{(ik), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \\
\equiv & \{ \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}, \{(il)^{-1}, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\} \\
& (kl)^{-1}\{(il), (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}(kl)\} \{(ik), (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq).
\end{aligned}$$

(12) $\wedge$ (13).

Let $f = (pq)(ik)^\delta - \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)$, $g = (ik)^\delta(jl)^\varepsilon - (jl)^\varepsilon(ik)^\delta$. Then $w = (pq)(ik)^\delta(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pq)(jl)^\varepsilon(ik)^\delta - \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(jl)^\varepsilon.$$

There are two cases to consider.

1) $p < i < q < k, j < i < k < l$. In this case, there are three subcases to consider.

a) $p < j, p < j < i < q < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (pq)(jl)^\varepsilon(ik)^\delta \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\} \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)(ik)^\delta \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(pl), (kl)^{-1}(ql)(kl)\}\} \\
& (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq).
\end{aligned}$$

If $\delta = 1$, then

$$\begin{aligned}
& \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(pl), \{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}\{(ql), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}\{(kl), (il)(kl)\}\}\}(ik)^\delta(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(pl), (kl)^{-1}(ql)(kl)\}\} \\
& \{(ik)^\delta(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)\{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}, \{(pl)^{-1}, (kl)\}\{\{(pl), (kl)\}, \\
& \{(kl)^{-1}, (pl)(kl)\}\{(ql), (pl)^{-1}(kl)^{-1}(pl)(kl)\}\{(kl), (pl)(kl)\}\}\} \\
& (pk)(ik)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(pl), \{(ql), (kl)\}\{(kl), (ql)(kl)\}\}\} \\
& (qk)(pk)(ik)^\delta(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(pl)^{-1}, (kl)^{-1}(pl)^{-1}\} \\
& \{\{(pl), (kl)^{-1}(pl)^{-1}\}, \{(ql), (kl)(pl)(kl)^{-1}(pl)^{-1}\}\{(kl), (pl)^{-1}\}\}\} \\
& (pk)^{-1}(qk)(pk)(ik)(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(pl), \{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}\{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}\{(kl), (ql)^{-1}\}\}\} \\
& \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}\{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq).
\end{aligned}$$

If $\delta = -1$, then by using the result of the case of $\delta = 1$, we have

$$\begin{aligned}
& \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(jl)^\varepsilon \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(pl), \{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}\{(ql), (kl)(il) \\
& (kl)^{-1}(il)^{-1}\}\{(kl), (il)^{-1}\}\}\}(ik)^\delta(pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)(pq) \\
\equiv & (qk)^{-1}(pk)^{-1}(qk)(pk)\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\{(pl), (kl)^{-1}(ql)(kl)\}\} \\
& \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \\
\equiv & \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}\{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq).
\end{aligned}$$

b) $p = j, p = j < i < q < k < l$.

$$\begin{aligned}
& (pq)(jl)^\varepsilon(ik)^\delta = (jq)(jl)^{-1}(ik)^\delta \\
& \equiv \{(jl)^\varepsilon, (ql)\}\{(ik)^\delta, (jk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)(qk)\}(jq) \quad \text{and} \\
& \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(jl)^\varepsilon \\
& = \{(ik)^\delta, (jk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)(qk)\}(jq)(jl)^\varepsilon \\
& \equiv (qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(jk)(ik)^\delta(jk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)(qk)\{(jl)^\varepsilon, (ql)\}(jq) \\
& \equiv (qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(jk)(ik)^\delta(jk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)\{(jl)^\varepsilon, \{(ql), (kl)\}\}(qk)(jq) \\
& \equiv (qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(jk)(ik)^\delta(jk)^{-1}(qk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, \\
& \quad \{(ql), (jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(kl)\}, \{(kl), (jl)(kl)\}\}(jk)(qk)(jq) \\
& \equiv (qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(jk)(ik)^\delta(jk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, \{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\} \\
& \quad \{(kl), (ql)^{-1}\}\}(qk)^{-1}(jk)(qk)(jq) \\
& \equiv (qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(jk)(ik)^\delta\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, \{(ql), (kl)(jl) \\
& \quad (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(kl), (jl)^{-1}\}\}(jk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)(qk)(jq) \\
& \equiv (qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(jk)(ik)^\delta\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(ql)(kl)\}(jk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)(qk)(jq).
\end{aligned}$$

If $\delta = 1$, then

$$\begin{aligned}
& \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(jl)^\varepsilon \\
& \equiv (qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(jk)\{(jl)^\varepsilon, \{(kl)^{-1}, (il)(kl)\}\{(ql), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\} \\
& \quad \{(kl), (il)(kl)\}\}(ik)^\delta(jk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)(qk)(jq) \\
& \equiv (qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(jk)\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(ql)(kl)\}(ik)^\delta(jk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)(qk)(jq) \\
& \equiv (qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)\}, \{(kl)^{-1}, (jl)(kl)\}\{(ql), (jl)^{-1}(kl)^{-1}(jl)(kl)\} \\
& \quad \{(kl), (jl)(kl)\}\}(jk)(ik)^\delta(jk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)(qk)(jq) \\
& \equiv (qk)^{-1}(jk)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, \{(ql), (kl)\}\{(kl), (ql)(kl)\}\} \\
& \quad (qk)(jk)(ik)^\delta(jk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)(qk)(jq) \\
& \equiv (qk)^{-1}\{\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}, \{(ql), (kl)(jl)(kl)^{-1}(jl)^{-1}\}\{(kl), (jl)^{-1}\}\} \\
& \quad (jk)^{-1}(qk)(jk)(ik)^\delta(jk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)(qk)(jq) \\
& \equiv \{(jl)^\varepsilon, \{(kl)^{-1}, (ql)^{-1}\}\{(ql), (kl)^{-1}(ql)^{-1}\}\{(kl), (ql)^{-1}\}\} \\
& \quad \{(ik)^\delta, (jk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)(qk)\}(jq) \\
& \equiv \{(jl)^\varepsilon, (ql)\}\{(ik)^\delta, (jk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)(qk)\}(jq).
\end{aligned}$$

If $\delta = -1$, then by using the result of the case of $\delta = 1$, we have

$$\begin{aligned}
& \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq)(jl)^\varepsilon \\
& \equiv (qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(jk)\{(jl)^\varepsilon, \{(kl)^{-1}, (il)^{-1}\}\{(ql), (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\} \\
& \quad \{(kl), (il)^{-1}\}\}(ik)^\delta(jk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)(qk)(jq) \\
& \equiv (qk)^{-1}(jk)^{-1}(qk)(jk)\{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(ql)(kl)\}(ik)^\delta(jk)^{-1}(qk)^{-1}(jk)(qk)(jq) \\
& \equiv \{(jl)^\varepsilon, (ql)\}\{(ik)^\delta, (jl)^{-1}(qk)^{-1}(jk)(qk)\}(jq).
\end{aligned}$$

c) $p > j, j < p < i < q < k < l$.

$$\begin{aligned}(f, g)_w &\equiv (jl)^\varepsilon \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \\ &\quad - (jl)^\varepsilon \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \\ &\equiv 0.\end{aligned}$$

2) $i < k < j < l$.

In this case, we have $p < i < q < k < j < l$ and

$$\begin{aligned}(f, g)_w &\equiv (jl)^\varepsilon \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \\ &\quad - (jl)^\varepsilon \{(ik)^\delta, (pk)^{-1}(qk)^{-1}(pk)(qk)\}(pq) \\ &\equiv 0.\end{aligned}$$

(13) $\wedge$ (7)

Let $f = (ip)^\delta(jk)^{-1} - (jk)^{-1}(ip)^\delta$, $g = (jk)^{-1}(kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1}$, $j < i < p < k < l$ or $i < p < j < k < l$. Then $w = (ip)^\delta(jk)^{-1}(kl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned}(f, g)_w &= (ip)^\delta \{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - (jk)^{-1}(ip)^\delta(kl)^\varepsilon \\ &\equiv \{(kl)^\varepsilon, (jl)^{-1}\}(jk)^{-1}(ip)^\delta - (jk)^{-1}(kl)^\varepsilon(ip)^\delta \\ &\equiv 0.\end{aligned}$$

(13) $\wedge$ (8)

Let $f = (ip)^\delta(jk) - (jk)(ip)^\delta$, $g = (jk)(kl)^\varepsilon - \{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk)$, $j < i < p < k < l$ or $i < p < j < k < l$. Then $w = (ip)^\delta(jk)(kl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned}(f, g)_w &= (ip)^\delta \{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk) - (jk)(ip)^\delta(kl)^\varepsilon \\ &\equiv \{(kl)^\varepsilon, (jl)(kl)\}(jk)(ip)^\delta - (jk)(kl)^\varepsilon(ip)^\delta \\ &\equiv 0.\end{aligned}$$

(13) $\wedge$ (9)

Let $f = (ip)^\delta(jk)^{-1} - (jk)^{-1}(ip)^\delta$, $g = (jk)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1}$, $j < i < p < k < l$ or $i < p < j < k < l$. Then $w = (ip)^\delta(jk)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned}(f, g)_w &= (ip)^\delta \{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1} - (jk)^{-1}(ip)^\delta(jl)^\varepsilon \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (kl)^{-1}(jl)^{-1}\}(jk)^{-1}(ip)^\delta - (jk)^{-1}(jl)^\varepsilon(ip)^\delta \\ &\equiv 0.\end{aligned}$$

(13) $\wedge$ (10)

Let $f = (ip)^\delta(jk) - (jk)(ip)^\delta$, $g = (jk)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk)$, $j < i < p < k < l$ or $i < p < j < k < l$. Then $w = (ip)^\delta(jk)(jl)^\varepsilon$ and

$$\begin{aligned}(f, g)_w &= (ip)^\delta \{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk) - (jk)(ip)^\delta(jl)^\varepsilon \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (kl)\}(jk)(ip)^\delta - (jk)(jl)^\varepsilon(ip)^\delta \\ &\equiv 0.\end{aligned}$$

(13) $\wedge$ (11)
 Let $f = (pq)^\delta(ik)^{-1} - (ik)^{-1}(pq)^\delta$, $g = (ik)^{-1}(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}$.
 Then $w = (pq)^\delta(ik)^{-1}(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pq)^\delta \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} - (ik)^{-1}(pq)^\delta(jl)^\varepsilon.$$

There are two cases to consider.

1) $i < p < q < k, i < j < k < l$. In this case, there are five subcases to consider.

a) $j < p, i < j < p < q < k < l$.

$$(f, g)_w \equiv \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}(pq)^\delta - (ik)^{-1}(jl)^\varepsilon(pq)^\delta \equiv 0.$$

b) $j = p, i < j = p < q < k < l$.

$$(f, g)_w = (jq)^\delta \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} - (ik)^{-1}(jq)^\delta(jl)^\varepsilon.$$

If $\delta = 1$, then

$$\begin{aligned} (f, g)_w &\equiv \{ \{(jl)^\varepsilon, (ql)\}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}(jq)^\delta \\ &\quad - (ik)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (ql)\}(jq)^\delta \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (ql)(kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(jq)^\delta(ik)^{-1} \\ &\quad - \{ \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(ql), (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\} \}(ik)^{-1}(jq)^\delta \\ &\equiv 0. \end{aligned}$$

If $\delta = -1$, then

$$\begin{aligned} (f, g)_w &\equiv \{ \{(jl)^\varepsilon, (ql)^{-1}(jl)^{-1}\}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}(jq)^\delta \\ &\quad - (ik)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (ql)^{-1}(jl)^{-1}\}(jq)^\delta \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (ql)^{-1}(jl)^{-1}(kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}(jq)^\delta \\ &\quad - \{ \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(ql)^{-1}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\} \\ &\quad \{(jl)^{-1}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\} \}(ik)^{-1}(jq)^\delta \\ &\equiv 0. \end{aligned}$$

c) $p < j < q, i < p < j < q < k < l$.

If $\delta = 1$, then

$$\begin{aligned} (f, g)_w &\equiv \{ \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}(pq)^\delta \\ &\quad - (ik)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}(pq)^\delta \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)(kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}(pq)^\delta \\ &\quad - \{ \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{ \{(ql)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \\ &\quad \{(pl), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\} \} \{(ql), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\} \}(ik)^{-1}(pq)^\delta \\ &\equiv 0. \end{aligned}$$

If $\delta = -1$, then

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}(kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}(pq)^\delta \\
&\quad - (ik)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}(pq)^\delta \\
&\equiv \{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}(kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}(pq)^\delta - \\
&\quad \{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{\{(pl), (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \\
&\quad \{(ql)^{-1}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}\}\{(pl)^{-1}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(pq)^\delta \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

d) $j = q, i < p < q = j < k < l$.

$$(f, g)_w = (pj)^\delta \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1} - (ik)^{-1}(pj)^\delta (jl)^\varepsilon.$$

If $\delta = 1$, then

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &\equiv \{\{(jl)^\varepsilon, (pl)(jl)\}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}(pj)^\delta \\
&\quad - (ik)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (pl)(jl)\}(pj)^\delta \\
&\equiv (jl)^\varepsilon, (pl)(jl)(kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}(pj)^\delta - \\
&\quad \{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(pl), (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\} \\
&\quad \{(jl), (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(pj)^\delta \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

If $\delta = -1$, then

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &\equiv \{\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}(pj)^\delta - \\
&\quad (ik)^{-1}\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}\}(pj)^\delta \\
&\equiv \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}(pj)^\delta - \{\{(jl)^\varepsilon, (kl)(il) \\
&\quad (kl)^{-1}(il)^{-1}\}, \{(pl)^{-1}, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}\}(ik)^{-1}(pj)^\delta \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

e) $j > q, i < p < q < j < k < l$.

$$(f, g)_w \equiv \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}(pq)^\delta - (ik)^{-1}(jl)^\varepsilon(pq)^\delta \equiv 0.$$

2) $p < q < i < k, i < j < k < l$, that is, $p < q < i < j < k < l$.

$$(f, g)_w \equiv \{(jl)^\varepsilon, (kl)(il)(kl)^{-1}(il)^{-1}\}(ik)^{-1}(pq)^\delta - (ik)^{-1}(jl)^\varepsilon(pq)^\delta \equiv 0.$$

(13) $\wedge$ (12)

Let $f = (pq)^\delta(ik) - (ik)(pq)^\delta$, $g = (ik)(jl)^\varepsilon - \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik)$. Then $w = (pq)^\delta(ik)(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pq)^\delta \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) - (ik)(pq)^\delta (jl)^\varepsilon.$$

There are two cases to consider.

1) $i < p < q < k, i < j < k < l$. In this case, there are five subcases to consider.

a) $j < p, i < j < p < q < k < l$.

$$(f, g)_w \equiv \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik)(pq)^\delta - (ik)(jl)^\varepsilon(pq)^\delta \equiv 0.$$

b) $p = j, i < j = p < q < k < l$.

$$(f, g)_w \equiv (jq)^\delta \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) - (ik)(jq)^\delta(jl)^\varepsilon.$$

If $\delta = 1$, then

$$\begin{aligned} (f, g)_w &\equiv \{ \{(jl)^\varepsilon, (ql)\}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \}(ik)(jq)^\delta - (ik) \{(jl)^\varepsilon, (ql)\}(jq)^\delta \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (ql)(il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik)(jq)^\delta - \\ &\quad \{ \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(ql), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\} \}(ik)(jq)^\delta \\ &\equiv 0. \end{aligned}$$

If $\delta = -1$, then

$$\begin{aligned} (f, g)_w &\equiv \{ \{(jl)^\varepsilon, (ql)^{-1}(jl)^{-1}\}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \}(ik)(jq)^\delta \\ &\quad - (ik) \{(jl)^\varepsilon, (ql)^{-1}(jl)^{-1}\}(jq)^\delta \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (ql)^{-1}(jl)^{-1}(il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik)(jq)^\delta \\ &\quad - \{ \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(ql)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\} \} \\ &\quad \{(jl)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\} \}(ik)(jq)^\delta \\ &\equiv 0. \end{aligned}$$

c) $p < j < q, i < p < j < q < k < l$.

If $\delta = 1$, then

$$\begin{aligned} (f, g)_w &\equiv \{ \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \}(ik)(pq)^\delta \\ &\quad - (ik) \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}(pq)^\delta \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)(il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik)(pq)^\delta - \\ &\quad \{ \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(pl)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\} \} \\ &\quad \{ \{(pl), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(ql), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\} \} \}(ik)(pq)^\delta \\ &\equiv 0. \end{aligned}$$

If $\delta = -1$, then

$$\begin{aligned} (f, g)_w &\equiv \{ \{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \}(ik)(pq)^\delta \\ &\quad - (ik) \{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}(pq)^\delta \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}(il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik)(pq)^\delta \\ &\quad - \{ \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(ql)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\} \} \\ &\quad \{ \{(ql)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}, \{(pl)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\} \} \}(ik)(pq)^\delta \\ &\equiv 0. \end{aligned}$$

d) $j = q, i < p < q = j < k < l$.

$$(f, g)_w = (pj)^\delta \{(jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl)\}(ik) - (ik)(pj)^\delta(jl)^\varepsilon.$$

If $\delta = 1$, then

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &\equiv \{ \{ (jl)^\varepsilon, (pl) \}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \} (ik)(pj)^\delta \\
&\quad - (ik) \{ (jl)^\varepsilon, (pl) \} (pj)^\delta \\
&\equiv \{ (jl)^\varepsilon, (pl)(il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \} (ik)(pj)^\delta - \\
&\quad \{ \{ (jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \} \{ (pl), (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \} \} (kl)(pj)^\delta \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

If $\delta = -1$, then

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &\equiv \{ (jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(jl)^{-1}(il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \} (ik)(pj)^\delta \\
&\quad - (ik) \{ (jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(jl)^{-1} \} (pj)^\delta \\
&\equiv \{ (jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(jl)^{-1}(il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \} (ik)(pj)^\delta \\
&\quad - \{ \{ (jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \}, \{ (pl)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \} \} \\
&\quad \{ (jl)^{-1}, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \} \} (ik)(pj)^\delta \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

e) $q > j, i < p < q < j < k < l$.

$$(f, g)_w \equiv \{ (jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \} (ik)(pq)^\delta - (ik)(jl)^\varepsilon(pq)^\delta \equiv 0.$$

2) $p < q < i < k, i < j < k < l$, that is, $p < q < i < j < k < l$.

$$(f, g)_w \equiv \{ (jl)^\varepsilon, (il)^{-1}(kl)^{-1}(il)(kl) \} (ik)(pq)^\delta - (ik)(jl)^\varepsilon(pq)^\delta \equiv 0.$$

(13) $\wedge$ (13)

Let $f = (pq)^\gamma(ik)^\delta - (ik)^\delta(pq)^\gamma, g = (ik)^\delta(jl)^\varepsilon - (jl)^\varepsilon(ik)^\delta$. Then $w = (pq)^\gamma(ik)^\delta(jl)^\varepsilon$ and

$$(f, g)_w = (pq)^\gamma(jl)^\varepsilon(ik)^\delta - (ik)^\delta(pq)^\gamma(jl)^\varepsilon.$$

There are four cases to consider.

1) $i < p < q < k, j < i < k < l$, that is, $j < i < p < q < k < l$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &\equiv (jl)^\varepsilon(ik)^\delta(pq)^\gamma - (ik)^\delta(jl)^\varepsilon(pq)^\gamma \\
&\equiv (jl)^\varepsilon(ik)^\delta(pq)^\gamma - (jl)^\varepsilon(ik)^\delta(pq)^\gamma \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

2) $i < p < q < k, i < k < j < l$, that is, $i < p < q < k < j < l$.

$$(f, g)_w \equiv (jl)^\varepsilon(ik)^\delta(pq)^\gamma - (jl)^\varepsilon(ik)^\delta(jl)^\varepsilon \equiv 0.$$

3) $p < q < i < k, j < i < k < l$. In this case, there are five subcases to consider.

a) $j < p$, that is, $j < p < q < i < k < l$.

$$(f, g)_w \equiv (jl)^\varepsilon(ik)^\delta(pq)^\gamma - (jl)^\varepsilon(ik)^\delta(pq)^\gamma \equiv 0.$$

b) $j = p$, that is, $j = p < q < i < k < l$.

$$(f, g)_w = (jq)^\gamma(jl)^\varepsilon(ik)^\delta - (ik)^\delta(jq)^\gamma(jl)^\varepsilon.$$

If $\gamma = 1$, then

$$\begin{aligned}(f, g)_w &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (ql)\}(ik)^\delta(jq)^\gamma - (ik)^\delta\{(jl)^\varepsilon, (ql)\}(jq)^\gamma \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (ql)\}(ik)^\delta(jq)^\gamma - \{(jl)^\varepsilon, (ql)\}(ik)^\delta(jq)^\gamma \\ &\equiv 0.\end{aligned}$$

If $\gamma = -1$, then

$$\begin{aligned}(f, g)_w &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (ql)^{-1}(jl)^{-1}\}(ik)^\delta(jq)^\gamma - (ik)^\delta\{(jl)^\varepsilon, (ql)^{-1}(jl)^{-1}\}(jq)^\gamma \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (ql)^{-1}(jl)^{-1}\}(ik)^\delta(jq)^\gamma - \{(jl)^\varepsilon, (ql)^{-1}(jl)^{-1}\}(ik)^\delta(jq)^\gamma \\ &\equiv 0.\end{aligned}$$

c) $p < j < q, p < j < q < i < k < l$.

If $\gamma = 1$, then

$$\begin{aligned}(f, g)_w &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}(ik)^\delta(pq)^\gamma \\ &\quad - (ik)^\delta\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}(pq)^\gamma \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}(ik)^\delta(pq)^\gamma \\ &\quad - \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(ql)^{-1}(pl)(ql)\}(ik)^\delta(pq)^\gamma \\ &\equiv 0.\end{aligned}$$

If $\gamma = -1$, then

$$\begin{aligned}(f, g)_w &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}(ik)^\delta(pq)^\gamma \\ &\quad - (ik)^\delta\{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}(pq)^\gamma \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}(ik)^\delta(pq)^\gamma \\ &\quad - \{(jl)^\varepsilon, (ql)(pl)(ql)^{-1}(pl)^{-1}\}(ik)^\delta(pq)^\gamma \\ &\equiv 0.\end{aligned}$$

d) $j = q$, that is, $p < q = j < i < k < l$.

$$(f, g)_w = (pj)^\gamma(jl)^\varepsilon(ik)^\delta - (ik)^\delta(pj)^\gamma(jl)^\varepsilon.$$

If $\gamma = 1$, then

$$\begin{aligned}(f, g)_w &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (pl)\}(ik)^\delta(pj)^\gamma - (ik)^\delta\{(jl)^\varepsilon, (pl)\}(pj)^\gamma \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (pl)\}(ik)^\delta(pj)^\gamma - \{(jl)^\varepsilon, (pl)\}(ik)^\delta(pj)^\gamma \\ &\equiv 0.\end{aligned}$$

If $\gamma = -1$, then

$$\begin{aligned}(f, g)_w &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(jl)^{-1}\}(ik)^\delta(pj)^\gamma - (ik)^\delta\{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(jl)^{-1}\}(pj)^\gamma \\ &\equiv \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(jl)^{-1}\}(ik)^\delta(pj)^\gamma - \{(jl)^\varepsilon, (pl)^{-1}(jl)^{-1}\}(ik)^\delta(pj)^\gamma \\ &\equiv 0.\end{aligned}$$

e) $j > q$, that is, $p < q < j < i < k < l$.

$$(f, g)_w \equiv (jl)^\varepsilon(ik)^\delta(pq)^\gamma - (jl)^\varepsilon(ik)^\delta(pq)^\gamma \equiv 0.$$

4) $p < q < i < k$, that is, $i < k < j < l, p < q < i < k < j < l$.

$$(f, g)_w \equiv (jl)^\varepsilon(ik)^\delta(pq)^\gamma - (jl)^\varepsilon(ik)^\delta(pq)^\gamma \equiv 0.$$

(14) $\wedge$ (1)

Let $f = \sigma_j^{-1}\sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1}, j < k - 1, g = \sigma_k^{-1}(pq)^\delta - (pq)^\delta\sigma_k^{-1}, k \neq p, p - 1, q, q - 1$. Then $w = \sigma_j^{-1}\sigma_k^{-1}(pq)^\delta$ and

$$(f, g)_w = \sigma_j^{-1}(pq)^\delta\sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1}(pq)^\delta \equiv (pq)^\delta\sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1} - (pq)^\delta\sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1} \equiv 0.$$

(14) $\wedge$ (2)

Let $f = \sigma_j^{-1}\sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1}, j < k - 1, g = \sigma_k^{-1}(k, k + 1)^\delta - (k, k + 1)^\delta\sigma_k^{-1}$. Then $w = \sigma_j^{-1}\sigma_k^{-1}(k, k + 1)^\delta$ and

$$(f, g)_w = \sigma_j^{-1}(k, k + 1)^\delta\sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1}(k, k + 1)^\delta \equiv (k, k + 1)^\delta\sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1} - (k, k + 1)^\delta\sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1} \equiv 0.$$

(14) $\wedge$ (3)

Let $f = \sigma_j^{-1}\sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1}, j < k - 1, g = \sigma_k^{-1}(k + 1, q)^\delta - (k, q)^\delta\sigma_k^{-1}, k + 1 < q$. Then $w = \sigma_j^{-1}\sigma_k^{-1}(k + 1, q)^\delta$ and

$$(f, g)_w = \sigma_j^{-1}(k, q)^\delta\sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1}(k + 1, q)^\delta \equiv (k, q)^\delta\sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1} - (k, q)^\delta\sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1} \equiv 0.$$

(14) $\wedge$ (4)

Let $f = \sigma_j^{-1}\sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1}, j < k - 1, g = \sigma_k^{-1}(kq)^\delta - \{(k + 1, q)^\delta, (k, k + 1)\}^\delta\sigma_k^{-1}, i + 1 < q$. Then $w = \sigma_j^{-1}\sigma_k^{-1}(kq)^\delta$ and

$$\begin{aligned} (f, g)_w &= \sigma_j^{-1}\{(k + 1, q)^\delta, (k, k + 1)\}^\delta\sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1}(kq)^\delta \\ &\equiv \{(k + 1, q)^\delta, (k, k + 1)\}^\delta\sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1} - \{(k + 1, q)^\delta, (k, k + 1)\}^\delta\sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1} \\ &\equiv 0. \end{aligned}$$

(14) $\wedge$ (5)

Let $f = \sigma_j^{-1}\sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1}, j < k - 1, g = \sigma_k^{-1}(q, k + 1)^\delta\sigma_k^{-1} - (q, k)^\delta\sigma_k^{-1}, q < k$. Then $w = \sigma_j^{-1}\sigma_k^{-1}(q, k + 1)^\delta$ and

$$(f, g)_w = \sigma_j^{-1}(q, k)^\delta\sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1}(q, k + 1)^\delta.$$

There are four cases to consider.

1) $q = k - 1, j < q$.

$$(f, g)_w = \sigma_j^{-1}(k - 1, k)^\delta\sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1}(k - 1, k + 1)^\delta.$$

If $j = k - 2$, then

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_{k-2}^{-1}(k-1, k)^\delta \sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1} \sigma_{k-2}^{-1}(k-1, k+1)^\delta \\
&\equiv (k-2, k)^\delta \sigma_k^{-1} \sigma_{k-2}^{-1} - \sigma_k^{-1}(k-2, k+1)^\delta \sigma_{k-2}^{-1} \\
&\equiv (k-2, k)^\delta \sigma_k^{-1} \sigma_{k-2}^{-1} - (k-2, k)^\delta \sigma_k^{-1} \sigma_{k-2}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

If $j < k - 2$, then

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= (k-1, k)^\delta \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1}(k-1, k+1)^\delta \sigma_j^{-1} \\
&\equiv (k-1, k)^\delta \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1} - (k-1, k)^\delta \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

2) $j < q < k - 1$.

If $j = q - 1$, then

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_{q-1}^{-1}(q, k)^\delta \sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1} \sigma_{q-1}^{-1}(q, k+1)^\delta \\
&\equiv (q-1, k)^\delta \sigma_k^{-1} \sigma_{q-1}^{-1} - \sigma_k^{-1}(q-1, k+1)^\delta \sigma_{q-1}^{-1} \\
&\equiv (q-1, k)^\delta \sigma_k^{-1} \sigma_{q-1}^{-1} - (q-1, k)^\delta \sigma_k^{-1} \sigma_{q-1}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

If $j < q - 1$, then

$$(f, g)_w \equiv (q, k)^\delta \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1}(q, k+1)^\delta \sigma_j^{-1} \equiv (q, k)^\delta \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1} - (q, k)^\delta \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1} \equiv 0.$$

3) $q = j < k - 1$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_q^{-1}(q, k)^\delta \sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1} \sigma_q^{-1}(q, k+1)^\delta, \\
&\equiv \{(q+1, k)^\delta, (q, q+1)\} \sigma_k^{-1} \sigma_q^{-1} - \sigma_k^{-1} \{(q+1, k+1)^\delta, (q, q+1)\} \sigma_q^{-1} \\
&\equiv \{(q+1, k)^\delta, (q, q+1)\} \sigma_k^{-1} \sigma_q^{-1} - \{(q+1, k)^\delta, (q, q+1)\} \sigma_k^{-1} \sigma_q^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

4) $q < j < k - 1$.

$$(f, g)_w \equiv (q, k)^\delta \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1}(q, k+1)^\delta \sigma_j^{-1} \equiv (q, k)^\delta \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1} - (q, k)^\delta \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1} \equiv 0.$$

(14) $\wedge$ (6)

Let $f = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1}$, $j < k - 1$, $g = \sigma_k^{-1}(q, k)^\delta - \{(q, k+1)^\delta, (k, k+1)\} \sigma_k^{-1}$, $q < k$.
Then $w = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1}(q, k)^\delta$ and

$$(f, g)_w = \sigma_j^{-1} \{(q, k+1)^\delta, (k, k+1)\} \sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1}(q, k)^\delta.$$

There are four cases to consider.

1) $j = q - 1 < k - 1$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_{q-1}^{-1} \{ (q, k+1)^\delta, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1} \sigma_{q-1}^{-1} (q, k)^\delta \\
&\equiv \{ (q-1, k+1)^\delta, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1} \sigma_{q-1}^{-1} - \sigma_k^{-1} (q-1, k)^\delta \sigma_{q-1}^{-1} \\
&\equiv \{ (q-1, k+1)^\delta, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1} \sigma_{q-1}^{-1} - \{ (q-1, k+1)^\delta, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1} \sigma_{q-1}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

2) $j < q - 1, q < k$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \{ (q, k+1)^\delta, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} (q, k)^\delta \sigma_j^{-1} \\
&\equiv \{ (q, k+1)^\delta, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1} - \{ (q, k+1)^\delta, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

3) $j = q < k - 1$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_q^{-1} \{ (q, k+1)^\delta, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1} \sigma_q^{-1} (q, k)^\delta \\
&\equiv \{ \{ (q+1, k+1)^\delta, (q, q+1) \}, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1} \sigma_q^{-1} \\
&\quad - \sigma_k^{-1} \{ (q+1, k)^\delta, (q, q+1) \} \sigma_q^{-1} \\
&\equiv \{ (q+1, k+1)^\delta, (q, q+1)(k, k+1) \} \sigma_k^{-1} \sigma_q^{-1} \\
&\quad - \{ \{ (q+1, k+1)^\delta, (k, k+1) \}, (q, q+1) \} \sigma_k^{-1} \sigma_q^{-1} \\
&\equiv \{ (q+1, k+1)^\delta, (k, k+1)(q, q+1) \} \sigma_k^{-1} \sigma_q^{-1} \\
&\quad - \{ (q+1, k+1)^\delta, (k, k+1) \}, (q, q+1) \} \sigma_k^{-1} \sigma_q^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

4) $q < j < k - 1$.

$$(f, g)_w \equiv \{ (q, k+1)^\delta, (k, k+1) \} \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} (q, k)^\delta \sigma_j^{-1} \equiv 0.$$

(14) $\wedge$ (14)

Let $f = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1}$, $g = \sigma_k^{-1} \sigma_l^{-1} - \sigma_l^{-1} \sigma_k^{-1}$, $j < k - 1 < k < l - 1 < l$. Then $w = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \sigma_l^{-1}$ and

$$(f, g)_w = \sigma_j^{-1} \sigma_l^{-1} \sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_l^{-1} \equiv \sigma_l^{-1} \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1} - \sigma_l^{-1} \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1} \equiv 0.$$

(14) $\wedge$ (15)

Let $f = \sigma_q^{-1} \sigma_j^{-1} - \sigma_j^{-1} \sigma_q^{-1}$, $q < j - 1$, $g = \sigma_j^{-1} \sigma_{k,j+1} - \sigma_{k,j+1} \sigma_j^{-1}$, $k < j$. Then $w = \sigma_q^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{k,j+1}$ and

$$(f, g)_w = \sigma_q^{-1} \sigma_{k,j+1} \sigma_j^{-1} - \sigma_j^{-1} \sigma_q^{-1} \sigma_{k,j+1}.$$

There are four cases to consider.

1) $k < q < j - 1$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &\equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{q-1}^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} - \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{q-1}^{-1} \\
&\equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_{q-1}^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_{q-1}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

2) $q = k < j - 1$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_k^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} - \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
&\equiv (k, k+1)^{-1} \sigma_{k+1}^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} - \sigma_j^{-1} (k, k+1)^{-1} \sigma_{k+1}^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
&\equiv (k, k+1)^{-1} \sigma_{k+1}^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} - (k, k+1)^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{k+1}^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
&\equiv (k, k+1)^{-1} \sigma_{k+1}^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} - (k, k+1)^{-1} \sigma_{k+1}^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

3) $q = k - 1 < j - 1$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_{k-1}^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} - \sigma_j^{-1} \sigma_{k-1}^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
&\equiv \sigma_{k-1}^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} - \sigma_{k-1}^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

4) $q < k - 1 < j - 1$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &\equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_q^{-1} - \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_q^{-1} \\
&\equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_q^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_q^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(14) $\wedge$ (16)

Let $f = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1}$, $j < k - 1$, $g = \sigma_k^{-1} \sigma_k^{-1} - (k, k+1)^{-1}$. Then $w = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \sigma_k^{-1}$ and

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_j^{-1} (k, k+1)^{-1} - \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \\
&\equiv (k, k+1)^{-1} \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \sigma_k^{-1} \sigma_j^{-1} \\
&\equiv (k, k+1)^{-1} \sigma_j^{-1} - (k, k+1)^{-1} \sigma_j^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(15) $\wedge$ (1)

Let $f = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}$, $g = \sigma_j^{-1} (pq)^\delta - (pq)^\delta \sigma_j^{-1}$, $k < j$, $j \neq p, p-1, q, q-1$. Then $w = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} (pq)^\delta$ and

$$(f, g)_w = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (pq)^\delta \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} (pq)^\delta.$$

There are four cases to consider.

1) $p > j + 1$.

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &\equiv (pq)^\delta \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} - (pq)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv (pq)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} - (pq)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

2) $p = j - 1$.

In this case, we have $q > j + 1$ and

$$\begin{aligned}
& \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (j-1, q)^\delta \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} \{(j, q)^\delta, (j-1, j)\} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} (j-1, q) (jq)^\delta (j-1, q)^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} (kq) (jq)^\delta (kq)^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & (kq) \{(j+1, q)^\delta, (j, j+1)\} (kq)^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & (kq) (jq) (j+1, q)^\delta (jq)^{-1} (kq)^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}, \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} (j-1, q)^\delta \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \{(jq)^\delta, (j-1, j)\} \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} (j-1, q) (jq)^\delta (j-1, q)^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (j-1, q) (jq) (j+1, q)^\delta (j-1, q)^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & (kq) (jq) (kq)^{-1} (kq) (j+1, q)^\delta (kq)^{-1} (kq) (jq)^{-1} (kq)^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & (kq) (jq) (j+1, q)^\delta (jq)^{-1} (kq)^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

3) $k \leq p < j - 1$. In this case, there are three subcases to consider.

a) $q = j - 1$.

$$\begin{aligned}
& \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (pq)^\delta \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} \{(pj)^\delta, (j-1, j)\} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_p^{-1} \{(pj)^\delta, (p+1, j)\} \sigma_{p+1}^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{p-1}^{-1} \{(p+1, j)^\delta, (p, p+1)(pj)\} \sigma_p^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{p-1}^{-1} (p+1, j)^\delta \sigma_p^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \{(p+1, j+1)^\delta, (j, j+1)\} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} (pq)^\delta \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \{(pj)^\delta, (j-1, j)\} \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \{ \{(p, j+1)^\delta, (j, j+1)\}, \{(j-1, j+1), (j, j+1)\} \} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \{(p, j+1)^\delta, (j-1, j+1)(j, j+1)\} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} \{(p, j+1)^\delta, \{(j, j+1), (j-1, j+1)\} (j-1, j+1)\} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} \{(p, j+1)^\delta, (j-1, j+1)^{-1} (j, j+1)\} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_p^{-1} \{(p, j+1)^\delta, (p+1, j+1)^{-1} (j, j+1)\} \sigma_{p+1}^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{p-1}^{-1} \{(p+1, j+1)^\delta, (p, p+1)(p, j+1)^{-1} (j, j+1)\} \sigma_p^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{p-1}^{-1} (j, j+1)^{-1} (p+1, j+1)^\delta (j, j+1) \sigma_p^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & \{(p+1, j+1)^\delta, (j, j+1)\} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

b) $q > j + 1$.

$$\begin{aligned}
& \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (pq)^\delta \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_p^{-1} (pq)^\delta \sigma_{p+1}^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{p-1}^{-1} \{(p+1, q)^\delta, (p, p+1)\} \sigma_p^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{p-1}^{-1} (pq)^{-1} (p+1, q)^\delta (pq) \sigma_p^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} (kq)^{-1} (p+1, q)^\delta (kq) \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & (kq)^{-1} (p+1, q)^\delta (kq) \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} (pq)^\delta \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} (pq)^\delta \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_p^{-1} (pq)^\delta \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & \sigma_{kq}^{-1} (p+1, q)^\delta (kq) \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

c) $q < j - 1$.

In this case, we have $k \leq p < q < j - 1$ and

$$\begin{aligned}
& \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (pq)^\delta \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_q^{-1} (pq)^\delta \sigma_{q+1}^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{q-1}^{-1} \{(p, q+1)^\delta, (q, q+1)\} \sigma_q^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_p^{-1} \{(p, q+1)^\delta, (p+1, q+1)\} \sigma_{p+1}^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{p-1}^{-1} \{(p+1, q+1)^\delta, (p, p+1)(q, q+1)\} \sigma_p^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{p-1}^{-1} (p+1, q+1)^\delta \sigma_p^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} (p+1, q+1)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & (p+1, q+1)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}, \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} (pq)^\delta \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} (pq)^\delta \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_q^{-1} (pq)^\delta \sigma_{q+1}^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & (p+1, q+1)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

4) $p < k$. In this case, there are three subcases to consider.

a) $q > j + 1, p < k < j < j + 1 < q$.

$$\sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (pq)^\delta \sigma_j^{-1} \equiv \sigma_j^{-1} (pq)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \equiv (pq)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}$$

$$\text{and} \quad \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} (pq)^\delta \equiv (pq)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}.$$

b) $k \leq q \leq j-1 < j$.

$$\begin{aligned}
& \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (pq)^\delta \sigma_j^{-1} \\
& \equiv \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_q^{-1} (pq)^\delta \sigma_{q+1}^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
& \equiv \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{q-1}^{-1} \{(p, q+1)^\delta, (q, q+1)\} \sigma_q^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
& \equiv \sigma_j^{-1} \{(p, q+1)^\delta, (k, q+1)\} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
& \equiv \begin{cases} \{(p, j+1)^\delta, (k, j+1)(j, j+1)\} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} & \text{if } q+1 = j, \\ \{(p, q+1)^\delta, (k, q+1)\} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} & \text{if } q+1 < j. \end{cases}
\end{aligned}$$

If $q+1 = j$, then

$$\begin{aligned}
& \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} (pq)^\delta \\
& \equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \{(p, j)^\delta, (j-1, j)\} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \{ \{(p, j+1)^\delta, (j, j+1)\}, \{(j-1, j+1), (j, j+1)\} \} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \{(p, j+1)^\delta, (j-1, j+1)(j, j+1)\} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} \{(p, j+1)^\delta, \{(j, j+1), (j-1, j)\}(j-1, j+1)\} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} \{(p, j+1)^\delta, (j-1, j+1)(j, j+1)\} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \{(p, j+1)^\delta, (k, j+1)(j, j+1)\} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

If $q+1 < j$, then

$$\begin{aligned}
& \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} (pq)^\delta \equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} (pq)^\delta \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_q^{-1} (pq)^\delta \sigma_{q+1}^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \{(p, q+1)^\delta, (k, q+1)\} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

c) $q < k, p < q < k < j$.

$$\sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (pq)^\delta \sigma_j^{-1} \equiv \sigma_j^{-1} (pq)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \equiv (pq)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}$$

$$\text{and} \quad \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} (pq)^\delta \equiv (pq)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}.$$

(15) $\wedge$ (2)

Let $f = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}$, $k < j$, $g = \sigma_j^{-1} (j, j+1)^\delta - (j, j+1)^\delta \sigma_j^{-1}$. Then $w = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} (j, j+1)^\delta$ and

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (j, j+1)^\delta \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} (j, j+1)^\delta \\
&\equiv \sigma_j^{-1} (k, k+1)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} (j-1, j+1)^\delta \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv (k, j)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} - (k, j)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(15) $\wedge$ (3)

Let $f = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}$, $k < j$, $g = \sigma_j^{-1} (j+1, q)^\delta - (jq)^\delta \sigma_j^{-1}$, $j+1 < q$.

Then $w = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} (j+1, q)^\delta$ and

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (j, q)^\delta \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} (j+1, q)^\delta \\
&\equiv \sigma_j^{-1} (kq)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} (j+1, q)^\delta \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv (kq)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} - (kq)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(15) $\wedge$ (4)

Let $f = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}$, $k < j$, $g = \sigma_j^{-1} (jq)^\delta - \{(j+1, q)^\delta, (j, j+1)\} \sigma_j^{-1}$, $j+1 < q$. Then $w = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} (jq)^\delta$ and

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \{(j+1, q)^\delta, (j, j+1)\} \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} (jq)^\delta \\
&\equiv \sigma_j^{-1} \{(j+1, q)^\delta, (k, j+1)\} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} (j-1, q)^\delta \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv \{(jq)^\delta, (kj)\} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (j-1, q)^\delta \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv \{(jq)^\delta, (kj)\} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} - \{(jq)^\delta, (kj)\} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(15) $\wedge$ (5)

Let $f = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}$, $k < j$, $g = \sigma_j^{-1} (i, j+1)^\delta - (ij)^\delta \sigma_j^{-1}$, $i < j$. Then $w = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} (i, j+1)^\delta$ and

$$(f, g)_w = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (ij)^\delta \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} (i, j+1)^\delta.$$

There are two cases to consider.

1) $k \leq i < j$.

If $i = j-1$, then

$$\begin{aligned}
&\sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (ij)^\delta \sigma_j^{-1} = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (j-1, j)^\delta \sigma_j^{-1} \\
&\equiv \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} (j-1, j)^\delta \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \\
&\equiv \sigma_j^{-1} (kj)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
&\equiv \{(k, j+1)^\delta, (j, j+1)\} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} (j-1, j+1)^\delta \\
&\equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \{(j, j+1)^\delta, (j-1, j)\} \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} (j-1, j+1) (j, j+1)^\delta (j-1, j+1)^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (j-1, j) (j, j+1)^\delta (j-1, j)^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv (kj) (k, j+1)^\delta (kj)^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv \{(k, j+1)^\delta, (j, j+1)\} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

If $i < j - 1$, then

$$\begin{aligned}
& \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (ij)^\delta \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_i^{-1} (i, i+1)^\delta \sigma_{i+1}^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} (k, i+1)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & (k, i+1)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \quad \text{and} \\
& \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} (i, j+1)^\delta \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} (i, j+1)^\delta \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_i^{-1} (i, i+1)^\delta \sigma_{i+1}^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & (k, i+1)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

2) $i < k < j$. We have

$$\sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (ij)^\delta \sigma_j^{-1} \equiv \sigma_j^{-1} (ik)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \equiv (ik)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}$$

and

$$\sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} (i, j+1)^\delta \equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} (i, j+1)^\delta \sigma_{j-1}^{-1} \equiv (ik)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}.$$

(15) $\wedge$ (6)

Let $f = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}$, $k < j$, $g = \sigma_j^{-1} (ij)^\delta - \{(i, j+1)^\delta, (j, j+1)^\delta\} \sigma_j^{-1}$, $i < j$. Then $w = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} (ij)^\delta$ and

$$(f, g)_w = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \{(i, j+1)^\delta, (j, j+1)^\delta\} \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} (ij)^\delta.$$

There are two cases to consider.

1) $k \leq i < j$.

If $i = j - 1$, then

$$\begin{aligned}
& \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \{(i, j+1)^\delta, (j, j+1)\} \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} \{ \{(j, j+1)^\delta, (j-1, j)\}, (j-1, j+1) \} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} (j-1, j+1)^{-1} (j-1, j)^{-1} (j, j+1)^\delta \\
& (j-1, j) (j-1, j+1) \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} (j-1, j+1)^{-1} \{ (j, j+1)^\delta, (j-1, j+1^{-1}) \} \\
& (j-1, j+1) \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} (j, j+1)^\delta \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} (j, j+1)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & (j, j+1)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} (j-1, j)^\delta \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} (j-1, j)^\delta \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \{ (j-1, j+1)^\delta, (j, j+1) \} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} \{ \{ (j, j+1)^\delta, (j-1, j) \}, (j-1, j+1) \} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} (j-1, j+1)^{-1} (j-1, j)^{-1} (j, j+1)^\delta (j-1, j) (j-1, j+1) \\
& \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & (j, j+1)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

If $i < j - 1$, then

$$\begin{aligned}
& \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \{(i, j+1)^\delta, (j, j+1)\} \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_i^{-1} \{ (i, j+1)^\delta, (i+1, j+1) \} \sigma_{i+1}^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{i-1}^{-1} \{ \{ (i+1, j+1)^\delta, (i, i+1) \}, (i, j+1) \} \sigma_i^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{i-1}^{-1} (i+1, j+1)^\delta \sigma_i^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & \sigma_j^{-1} (i+1, j+1)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
\equiv & (i+1, j)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} (ij)^\delta \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} (i, j-1)^\delta \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (i, j-1)^\delta \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
\equiv & \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} \{ (ij)^\delta, (j-1, j) \} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

If $i = j - 2$, then

$$\begin{aligned}
& \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} \{(ij)^\delta, (j-1, j)\} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-3}^{-1} \{(j-1, j)^\delta, (j-2, j-1)\}, (j-2, j)\} \sigma_{j-2}^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-3}^{-1} (j-2, j)^{-1} (j-2, j-1)^{-1} (j-1, j)^\delta (j-2, j-1) (j-2, j) \\
& \quad \sigma_{j-2}^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-3}^{-1} (j-1, j)^\delta \sigma_{j-2}^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv (j-1, j)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv (i+1, j)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

If $i < j - 2$, then

$$\begin{aligned}
& \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} \{(ij)^\delta, (j-1, j)\} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_i^{-1} \{(ij)^\delta, (i+1, j)\} \sigma_{i+1}^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{i-1}^{-1} \{(i+1, j)^\delta, (i, i+1)\}, (ij)\} \sigma_i^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{i-1}^{-1} (i+1, j)^\delta \sigma_i^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv (i+1, j)^\delta \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

2) $i < k < j$.

$$\begin{aligned}
& \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \{(i, j+1)^\delta, (j, j+1)\} \sigma_j^{-1} \\
& \equiv \sigma_j^{-1} \{(i, j+1)^\delta, (k, j+1)\} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
& \equiv \{(ij)^\delta, (kj)\} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} (ij)^\delta \\
& \equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} (i, j-1)^\delta \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (i, j-1)^\delta \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} \{(ij)^\delta, (j-1, j)\} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \{(ij)^\delta, (kj)\} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

(15) $\wedge$ (14)

Let $f = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}$, $k < j$, $g = \sigma_j^{-1} \sigma_q^{-1} - \sigma_q^{-1} \sigma_j^{-1}$, $j < q - 1$. Then $w = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_q^{-1}$ and

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_q^{-1} \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_q^{-1} \\
&\equiv \sigma_q^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} - \sigma_q^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv \sigma_q^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} - \sigma_q^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(15) $\wedge$ (15)

Let $f = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}$, $k < j$, $g = \sigma_j^{-1} \sigma_l^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} - \sigma_l^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}$, $l < j$. Then $w = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_l^{-1} \cdots \sigma_j^{-1}$ and

$$(f, g)_w = -\sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_l^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} + \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_l^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}.$$

There are two cases to consider.

1) $l = j - 1$.

$$\begin{aligned}
& \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_l^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
& \equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} (j-1, j)^{-1} \sigma_j^{-1} \\
& \equiv (j, j+1)^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (j, j+1)^{-1} \\
& \equiv (j, j+1)^{-1} (k, j+1)^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \quad \text{and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_l^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} (j-1, j)^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_j^{-1} (kj)^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \{(k, j+1)^{-1}, (j, j+1)\} (j, j+1)^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv (j, j+1)^{-1} (k, j+1)^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

2) $l < j - 1$.

$$\begin{aligned}
& \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_l^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \\
& \equiv \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_l^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-2}^{-1} \\
& \equiv \sigma_{kj+1} \sigma_{lj+1} \sigma_{j-2}^{-1} \\
& \equiv \begin{cases} \sigma_{lj+1} \sigma_{k-1j} \sigma_{j-2}^{-1} & \text{if } l < k, \\ (k, l+1)^{-1} \sigma_{l+1j+1} \sigma_{kj} \sigma_{j-2}^{-1} & \text{if } k \leq l. \end{cases}
\end{aligned}$$

If $l < k$, then

$$\begin{aligned}
& \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_l^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_j^{-1} \sigma_{kj} \sigma_{lj} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_j^{-1} \sigma_{lj} \sigma_{k-1j-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_j^{-1} \sigma_{lj+1} \sigma_{k-1j} \\
& \equiv \sigma_{lj+1} \sigma_{k-1j} \sigma_{j-2}^{-1}.
\end{aligned}$$

If $k \leq l$, then $k \leq l < j - 1$ and

$$\begin{aligned}
& \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_l^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_j^{-1} \sigma_{kj} \sigma_{lj} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_j^{-1} (k, l+1)^{-1} \sigma_{l+1j} \sigma_{kj-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
& \equiv \sigma_j^{-1} (k, l+1)^{-1} \sigma_{l+1j+1} \sigma_{kj} \\
& \equiv (k, l+1)^{-1} \sigma_{l+1j+1} \sigma_{kj} \sigma_{j-2}^{-1}.
\end{aligned}$$

(15) $\wedge$ (16)

Let $f = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}$, $k < j$, $g = \sigma_j^{-1} \sigma_j^{-1} - (j, j+1)^{-1}$. Then $w = \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_j^{-1}$ and

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} (j, j+1)^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \\
&\equiv \sigma_j^{-1} (k, j+1)^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1}.
\end{aligned}$$

If $k < j - 1$, then

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &\equiv (kj)^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} (j-1, j)^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv (kj)^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} - (kj)^{-1} \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_{j-2}^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

If $k = j - 1$, then

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &\equiv (j-1, j)^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} - \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv (j-1, j)^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} - (j-1, j)^{-1} \sigma_j^{-1} \sigma_{j-1}^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(16) $\wedge$ (1)

Let $f = \sigma_k^{-1} \sigma_k^{-1} - (k, k+1)^{-1}$, $g = \sigma_k^{-1} (ij)^\delta - (ij)^\delta \sigma_k^{-1}$, $k \neq i, i-1, j, j-1$. Then $w = \sigma_k^{-1} \sigma_k^{-1} (ij)^\delta$ and

$$(f, g)_w = \sigma_k^{-1} (ij)^\delta \sigma_k^{-1} - (k, k+1)^{-1} (ij)^\delta.$$

There are three cases to consider.

1) If $k \geq j+1$, $i < j < j+1 \leq k < k+1$, then

$$(f, g)_w \equiv (ij)^\delta (k, k+1)^{-1} - (k, k+1)^{-1} (ij)^\delta \equiv (k, k+1)^{-1} (ij)^\delta - (k, k+1)^{-1} (ij)^\delta \equiv 0.$$

2) If $i < k < j-1$, $i < k < k+1 < j$, then

$$(f, g)_w \equiv (ij)^\delta (k, k+1)^{-1} - (ij)^\delta (k, k+1)^{-1} \equiv 0.$$

3) If $k < i-1$, $k < k+1 < i < j$, then

$$(f, g)_w \equiv (ij)^\delta (k, k+1)^{-1} - (ij)^\delta (k, k+1)^{-1} \equiv 0.$$

(16) $\wedge$ (2)

Let $f = \sigma_i^{-1} \sigma_i^{-1} - (i, i+1)^{-1}$, $g = \sigma_i^{-1} (i, i+1)^\delta - (i, i+1)^\delta \sigma_i^{-1}$. Then $w = \sigma_i^{-1} \sigma_i^{-1} (i, i+1)^\delta$ and

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_i^{-1} (i, i+1)^\delta \sigma_i^{-1} - (i, i+1)^{-1} (i, i+1)^\delta \\
&\equiv (i, i+1)^\delta \sigma_i^{-1} \sigma_i^{-1} - (i, i+1)^{-1} (i, i+1)^\delta \\
&\equiv (i, i+1)^\delta (i, i+1)^{-1} - (i, i+1)^{-1} (i, i+1)^\delta \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(16) $\wedge$ (3)

Let $f = \sigma_{i-1}^{-1} \sigma_{i-1}^{-1} - (i-1, i)^{-1}$, $g = \sigma_{i-1}^{-1} (ij)^\delta - (i-1, j)^\delta \sigma_{i-1}^{-1}$, $i < j$. Then $w = \sigma_{i-1}^{-1} \sigma_{i-1}^{-1} (ij)^\delta$ and

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_{i-1}^{-1} (i-1, j)^\delta \sigma_{i-1}^{-1} - (i-1, i)^{-1} (ij)^\delta \\
&\equiv \{(ij)^\delta, (i-1, i)\} (i-1, i)^{-1} - (i-1, i)^{-1} (ij)^\delta \\
&\equiv (i-1, i)^{-1} (ij)^\delta - (i-1, i)^{-1} (ij)^\delta \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(16) $\wedge$ (4)

Let $f = \sigma_i^{-1}\sigma_i^{-1} - (i, i+1)^{-1}$, $g = \sigma_i^{-1}(ij)^\delta - \{(i+1, j)^\delta, (i, i+1)\}\sigma_i^{-1}$, $i+1 < j$. Then $w = \sigma_i^{-1}\sigma_i^{-1}(ij)^\delta$ and

$$\begin{aligned}(f, g)_w &= \sigma_i^{-1}\{(i+1, j)^\delta, (i, i+1)\}\sigma_i^{-1} - (i, i+1)^{-1}(ij)^\delta \\ &\equiv \{(ij)^\delta, (i, i+1)\}(i, i+1)^{-1} - (i, i+1)^{-1}(ij)^\delta \\ &\equiv (i, i+1)^{-1}(ij)^\delta - (i, i+1)^{-1}(ij)^\delta \\ &\equiv 0.\end{aligned}$$

(16) $\wedge$ (5)

Let $f = \sigma_{j-1}^{-1}\sigma_{j-1}^{-1} - (j-1, j)^{-1}$, $g = \sigma_{j-1}^{-1}(ij)^\delta - (i, j-1)^\delta\sigma_{j-1}^{-1}$, $i < j-1$. Then $w = \sigma_{j-1}^{-1}\sigma_{j-1}^{-1}(ij)^\delta$ and

$$\begin{aligned}(f, g)_w &= \sigma_{j-1}^{-1}(i, j-1)^\delta\sigma_{j-1}^{-1} - (j-1, j)^{-1}(ij)^\delta \\ &\equiv \{(ij)^\delta, (j-1, j)\}(j-1, j)^{-1} - (j-1, j)^{-1}(ij)^\delta \\ &\equiv 0.\end{aligned}$$

(16) $\wedge$ (6)

Let $f = \sigma_j^{-1}\sigma_j^{-1} - (j, j+1)^{-1}$, $g = \sigma_j^{-1}(ij)^\delta - \{(i, j+1)^\delta, (j, j+1)\}\sigma_j^{-1}$, $i < j$. Then $w = \sigma_j^{-1}\sigma_j^{-1}(ij)^\delta$ and

$$\begin{aligned}(f, g)_w &= \sigma_j^{-1}\{(i, j+1)^\delta, (j, j+1)\}\sigma_j^{-1} - (j, j+1)^{-1}(ij)^\delta \\ &\equiv \{(ij)^\delta, (j, j+1)\}(j, j+1)^{-1} - (j, j+1)^{-1}(ij)^\delta \\ &\equiv 0.\end{aligned}$$

(16) $\wedge$ (14)

Let $f = \sigma_j^{-1}\sigma_j^{-1} - (j, j+1)^{-1}$, $g = \sigma_j^{-1}\sigma_k^{-1} - \sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1}$, $j < k-1$. Then $w = \sigma_j^{-1}\sigma_j^{-1}\sigma_k^{-1}$ and

$$\begin{aligned}(f, g)_w &= \sigma_j^{-1}\sigma_k^{-1}\sigma_j^{-1} - (j, j+1)^{-1}\sigma_k^{-1} \\ &\equiv \sigma_k^{-1}(j, j+1)^{-1} - (j, j+1)^{-1}\sigma_k^{-1} \\ &\equiv (j, j+1)^{-1}\sigma_k^{-1} - (j, j+1)^{-1}\sigma_k^{-1} \\ &\equiv 0.\end{aligned}$$

(16) $\wedge$ (15)

Let $f = \sigma_j^{-1}\sigma_j^{-1} - (j, j+1)^{-1}$, $g = \sigma_j^{-1}\sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1} - \sigma_k^{-1} \cdots \sigma_j^{-1}\sigma_{j-1}^{-1}$, $k < j$. Then $w =$

$\sigma_j^{-1}\sigma_j^{-1}\sigma_k^{-1}\cdots\sigma_j^{-1}$ and

$$\begin{aligned}
(f, g)_w &= \sigma_j^{-1}\sigma_k^{-1}\cdots\sigma_j^{-1}\sigma_{j-1}^{-1} - (j, j+1)^{-1}\sigma_k^{-1}\cdots\sigma_j^{-1} \\
&\equiv \sigma_k^{-1}\cdots\sigma_j^{-1}\sigma_{j-1}^{-1}\sigma_{j-1}^{-1} - (j, j+1)^{-1}\sigma_k^{-1}\cdots\sigma_j^{-1} \\
&\equiv \sigma_k^{-1}\cdots\sigma_j^{-1}(j-1, j)^{-1} - (j, j+1)^{-1}\sigma_k^{-1}\cdots\sigma_j^{-1} \\
&\equiv \sigma_k^{-1}\cdots\sigma_{j-1}^{-1}\{(j-1, j+1)^{-1}, (j, j+1)\}\sigma_j^{-1} - (j, j+1)^{-1}\sigma_k^{-1}\cdots\sigma_j^{-1} \\
&\equiv \sigma_k^{-1}\cdots\sigma_{j-2}^{-1}\{((j, j+1)^{-1}, (j-1, j)\}, (j-1, j+1)\}\sigma_{j-1}^{-1}\sigma_j^{-1} \\
&\quad - (j, j+1)^{-1}\sigma_k^{-1}\cdots\sigma_j^{-1} \\
&\equiv \sigma_k^{-1}\cdots\sigma_{j-2}^{-1}(j-1, j+1)^{-1}(j-1, j)^{-1}(j, j+1)^{-1} \\
&\quad (j-1, j)(j-1, j+1)\sigma_{j-1}^{-1}\sigma_j^{-1} - (j, j+1)^{-1}\sigma_k^{-1}\cdots\sigma_j^{-1} \\
&\equiv \sigma_k^{-1}\cdots\sigma_{j-2}^{-1}(j, j+1)^{-1}\sigma_{j-1}^{-1}\sigma_j^{-1} - (j, j+1)^{-1}\sigma_k^{-1}\cdots\sigma_j^{-1} \\
&\equiv (j, j+1)^{-1}\sigma_k^{-1}\cdots\sigma_j^{-1} - (j, j+1)^{-1}\sigma_k^{-1}\cdots\sigma_j^{-1} \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

(16) $\wedge$ (16)

Let $f = \sigma_i^{-1}\sigma_i^{-1} - (i, i+1)^{-1}$, $g = \sigma_i^{-1}\sigma_i^{-1} - (i, i+1)^{-1}$. Then $w = \sigma_i^{-1}\sigma_i^{-1}\sigma_i^{-1}$ and

$$(f, g)_w = \sigma_i^{-1}(i, i+1)^{-1} - (i, i+1)^{-1}\sigma_i^{-1} \equiv (i, i+1)^{-1}\sigma_i - (i, i+1)^{-1}\sigma_i \equiv 0.$$

For the cases of (17) $\wedge$ ((1) $\sim$ (17)) and ((1) $\sim$ (17)) $\wedge$ (17), the possible compositions are the cases of (17) $\wedge$ ((7) $\sim$ (13), (17)) and ((7) $\sim$ (13), (17)) $\wedge$ (17). For these cases, we can easily check that the compositions are trivial.

This completes our proof.

Acknowledgement: The authors would like to express their deepest gratitude to Professor L. A. Bokut for his kind guidance, useful discussions and enthusiastic encouragement.

References

- [1] E. Artin, Theorem of braid groups, Ann. of Math., 48(1947) 101-126.
- [2] G. M. Bergman, The diamond lemma for ring theory, Adv. in Math., 29(1978) 178-218.
- [3] L. A. Bokut, Unsolvability of the word problem, and subalgebras of finitely presented Lie algebras, Izv. Akad. Nauk. SSSR Ser. Mat., 36(1972) 1173-1219.
- [4] L. A. Bokut, Imbeddings into simple associative algebras, Algebra i Logika 15(1976) 117-142.
- [5] L. A. Bokut, V. V. Chaynikov, K. P. Shum, Markov and Artin normal form theorem for braid groups, Communication in Algebra, 35(2007) 1-11.
- [6] L. A. Bokut and Yuqun Chen, Gröbner-Shirshov basis for free Lie algebras: after A. I. Shirshov, SEA. Bull. Math., 31(2007) 1057-1076.

- [7] L. A. Bokut and K. P. Shum, Gröbner and Gröbner-Shirshov bases in algebra: an elementary approach, SEA Bull. Math., 29(2005) 227-252.
- [8] B. Buchberger, An algorithmical criteria for the solvability of algebraic systems of equations [in German], Aequationes Math., 4(1970) 374-383.
- [9] A. A. Markov, Foundation of the algebras theory of Braids, Proceedings of the Steklov Mathematical Institute, 16. Moscow-Leningrad, 1945.
- [10] A. I. Shirshov, Some algorithmic problem for Lie algebras, Sibirsk. Mat. Z., 3(1962) 292-296 (in Russian); English translation in SIGSAM Bull., 33(2)(1999) 3-6.